



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

CILOXAN® 3 mg/ml, øredråber, opløsning

Ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret CILOXAN® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge CILOXAN®
3. Sådan skal du bruge CILOXAN®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

CILOXAN® indeholder et antibiotikum, der virker på mange forskellige bakterier.

Du skal bruge CILOXAN® mod akut betændelse (infektion) i øregangen og det udvendige øre.

Lægen kan have givet dig CILOXAN® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CILOXAN®

Brug ikke CILOXAN®

Hvis du er allergisk over for ciprofloxacin, andre lignende stoffer (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge CILOXAN®

- Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, kløe eller nældefeber. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
- Kontakt lægen hvis du ikke får det bedre, eller betændelsen (infektionen) bliver værre.

Vær opmærksom på følgende

- Du må kun bruge CILOXAN® til drypning i øret.
- Du skal normalt ikke bruge CILOXAN® til børn under 1 år. Tal med lægen.
- Når du bruger CILOXAN®, skal du beskytte dig mod solen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge CILOXAN® øredråber under graviditet.

Amning

Du kan bruge CILOXAN® øredråber selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

CILOXAN® øredråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CILOXAN®

Brug altid CILOXAN® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 4 dråber i øregangen i det/de angrebne øre(r) 2 gange daglig – morgen og aften.

Børn over 1 år: 3 dråber i øregangen i det/de angrebne øre(r) 2 gange daglig – morgen og aften.

Hvis du bruger meché/otowick, skal du første gang bruge dobbelt dosis (dvs. 6 dråber til børn og 8 dråber til voksne).

Sådan bruger du CILOXAN® korrekt

1. Vask hænder.
2. Skru låget af flasken.
3. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
4. Læg dig ned med det betændte øre opad.
5. Placer flaskens spids tæt på øregangen.
6. Flaskens spids må ikke røre huden på eller i øret eller andet. Det kan forurene øredråberne.
7. Tryk forsigtigt i bunden af flasken med pegefingeren, så der kommer 1 dråbe ud ad gangen.
8. Lad være med at trykke på siden af flasken. Flasken er lavet, så man kun behøver at trykke let på bunden.
9. Hvis du skal behandle begge ører skal du gentage trin 5 - 7 for det andet øre.
10. Skru låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget CILOXAN®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere CILOXAN®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med CILOXAN®. Hvis du har brugt for meget kan du skylle øret med lunken vand.

Hvis du har glemt at bruge CILOXAN®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge CILOXAN®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

CILOXAN® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Alvorligt hududslæt evt med kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
- Blæreformet udslæt og betændelse (infektion) i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Kløe i øret.
- Dårlig smag i munden.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

- Hovedpine, kvalme, hududslæt.
- Øresusen (tinnitus).

Meget sjældne bivirkninger:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Udslæt, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar CILOXAN® utilgængeligt for børn.
- Efter åbning af flasken må du kun bruge CILOXAN® i 4 uger.
- Brug ikke CILOXAN® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Skriv dato for hvornår du har åbnet flasken på linien nedenunder samt på etiketten og æsken.
- Flasken blev åbnet den: ---- / ---- / ----.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

CILOXAN® 3 mg/ml, øredråber indeholder:

- Aktivt stof: ciprofloxacin
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natriumacetat trihydrat, eddikesyre, manitol, dinatriumedetat, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til justering af surhedsgraden) og rensset vand.

CILOXAN®'s udseende og pakningsstørrelse

CILOXAN® er en farveløs opløsning i en 10 ml flaske med skruelåg (3 mg/ml).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgien

Repræsentant i Danmark:

Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre
Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008