



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

# DACRIOSOL® 1 mg/ml + 3 mg/ml, øjendråber, opløsning

Dextran/Hypromellose

## Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få DACRIOSOL® uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for DACRIOSOL®.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

## Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge DACRIOSOL®
3. Sådan skal du bruge DACRIOSOL®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du skal bruge DACRIOSOL® ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene).

Det virker ved at fugte og smøre dine øjne samt lindre iritation.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge DACRIOSOL® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DACRIOSOL®

### Brug ikke DACRIOSOL®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne.

### Vær ekstra forsigtig med at bruge DACRIOSOL®

Hvis dine øjne bliver ved med at være irriterede, skal du kontakte lægen.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge DACRIOSOL® til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige præparater.

### Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

### Graviditet

Du kan bruge DACRIOSOL® under graviditet.

### Amning

Du kan amme, selv om du bruger DACRIOSOL®.

### Trafik- og arbejdssikkerhed

DACRIOSOL® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

## Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i DACRIOSOL®

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før de sættes i igen.

## 3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DACRIOSOL®

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

### Den sædvanlige dosis er

#### Voksne

1 – 2 dråber efter behov.

### Sådan bruger du DACRIOSOL® korrekt

1. Vask hænder og sæt dig foran et spejl.
2. Skru låget af flasken.
3. Pas på, at flasken ikke rører noget, da indholdet så kan blive forurenset.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
5. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg ud på det relevante øje ved hjælp af den anden hånds pegefinger.

6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den rører det. Tryk let på flaskens bund med pegefingeren, så det antal dråber lægen har ordineret, falder ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.
7. Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 1-2 minutter, så lægemidlet lettere optages.
8. Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin 5-7.
9. Til sidst skrues låget på flasken.

### Hvis du har brugt for mange DACRIOSOL® øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere DACRIOSOL®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med DACRIOSOL®.

### Hvis du har glemt at bruge DACRIOSOL®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

## 4. BIVIRKNINGER

DACRIOSOL® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Lokale reaktioner som svien, brænden eller rødme i øjet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. OPBEVARING

- Opbevar DACRIOSOL® utilgængeligt for børn.
- Efter åbning skal DACRIOSOL® anvendes inden 4 uger.
- Udløbsdatoen (Anv.før:) er angivet på flasken og kartonen. DACRIOSOL® må ikke anvendes efter denne dato.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

### DACRIOSOL® 1 mg/ml + 3 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder

- **Aktive stoffer:** D1 mg/ml dextran 70 og 3 mg/ml hypromellose 4000.
- **Øvrige indholdsstoffer:** Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), dinatriumedetat, natriumchlorid, kaliumchlorid, natriumhydroxid og/eller saltsyre og rensset vand.

### Udseende og pakningsstørrelse

#### Pakningsstørrelse

Plastikflaske indeholdende 15 ml.

### Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

#### SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14  
B-2870 Puurs  
Belgien

#### Fremstiller

#### SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14  
B-2870 Puurs  
Belgien

### Repræsentant i Danmark

#### Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25  
2610 Rødovre  
Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i september 2008

# DACRIOSOL® augndropar, lausn

## Dextran og hýprómellósa

**Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir mikilvægar upplýsingar um notkun lyfsins.** Þetta lyf er fánlegt án lyfseðils. Engu að síður er nauðsynlegt nota DACRIOSOL® á réttan hátt til að ná sem bestum árangri.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðum.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

### Í fylgiseðilinum:

1. Hvað er DACRIOSOL® og við hverju er það notað
2. Áður en byrjað er að nota DACRIOSOL®
3. Hvernig á að nota DACRIOSOL®
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig á að geyma DACRIOSOL®
6. Aðrar upplýsingar

### 1. HVAD ER DACRIOSOL® OG VIÐ HVERJU ER ÞAÐ NOTAÐ

DACRIOSOL® er gervitár sem ætlað er að koma í staðinn fyrir eðlilega tárahninu og halda þurrum blettum á auganu rökum.

DACRIOSOL® er notað þegar tára- eða slímmyndun er ónóg.

### 2. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA DACRIOSOL®

#### Ekki má nota DACRIOSOL®

- ef þú ert með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni.

#### Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun DACRIOSOL®

- Lyfið inniheldur benzalkónklóríð sem rotvarnarefni og þú mátt því ekki nota lyfið ef þú ert með mjúkar augnlinsur í augunum. Óhætt er að setja linsurnar í 15 mínútum eftir að lyfinu var dreypt í augun.

- Leita skal til læknis ef sársauki í auga, sjóntruflanir, viðvarandi roði eða erting í auga koma fyrir á meðan þú notar lyfið, eða ef ekki hefur dregið úr augnþurrkinum eftir þriggja daga meðferð.

- Ekki má nota lyfið ef lausnin breytir um lit eða verður skjúð.

#### Notkun annarra lyfja:

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef önnur lyf eru notuð eða hafa verið notuð nýverið, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils. Ef þú ert að nota önnur augnlyf verður þú að láta 15 mínútur líða milli þess sem lyfin eru notuð.

#### Meðganga og brjóstgjöf

Ekki liggja fyrir neinar rannsóknarniðurstöður um notkun DACRIOSOL® á meðgöngu. En þar sem að lyfið inniheldur engin lyfjafræðilega virk efni er ekki gert ráð fyrir skaðlegum áhrifum á fóstur eða barn.

#### Akstur og notkun véla

Eins og við á um aðra augndropa getur sjónin orðið þokukennd um tíma eftir að lyfinu er dreypt í auga. Þess vegna átt þú hvorki að aka bifreið né nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

#### Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni DACRIOSOL®

Lyfið inniheldur benzalkónklóríð sem er rotvarnarefni, því ættir þú ekki að nota lyfið ef þú ert með mjúkar augnlinsur. Óhætt er að setja linsurnar í 15 mínútum eftir að lyfinu var dreypt í augun.


### 3. HVERNIG Á AÐ NOTA DACRIOSOL®

Athugið að lækinn getur ávísað lyfinu til annarrar notkunar og/eða í öðrum skammtastærðum en tilgreindar eru á fylgiseðli. Fylgið alltaf fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum sem fram koma á áritunarmiða apóteksins.

1-2 dropar í sjúkt auga strax og vart verður við augnþurrk, nema lækni hafi ráðlagt aðra notkun. Tilfinning um augnþurrk getur komið fram oft á hverri klist.

#### Notkunarleiðbeiningar


Með því að fylgja eftirfarandi notkunarleiðbeiningum tryggir þú rétta notkun DACRIOSOL® og mestan árangur:



- a) Þvoðu þér vel um hendurnar.
- b) Hristu glasið vel og taktu tappann af því.
- c) Hvolfdu glasinu og haltu því í annarri hendinni, á milli þumalfingurs og löngutangar.

d) Hallaðu höfðinu aftur.

e) Notaðu vísfingur hinnar handarinnar til að draga neðra augnlok sjúka augans gætilega niður.



f) Beindu dropasprota glassins að auganu og sem næst því, án þess að snerta það. Sláðu laust á botninn á glasinu með vísfingri, þannig að einn dropi falli niður í bilið á milli augans og augnloksins. *Gættu þess vandlega að dropasprotinn snerti hvorki augað né annað, til að koma í veg fyrir að augndroparnir mengjist.*



g) Lokaðu auganu varlega án þess að blikka og þrýstu á innri augnkrókinn með vísfingri í tvær mínútur.

h) Endurtaktu liði e) til g) fyrir hitt augað, ef þarf.

i) Settu tappann aftur á glasið og lokaðu því vandlega.

j) Þvoðu þér aftur um hendurnar.

### Ef stærri skammtur af DACRIOSOL® en mælt er fyrir um er notað

Sé of stór skammtur settur í augað er hægt að skola hann úr með volgu krana vatni.

### 4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur DACRIOSOL® valdið aukaverkunum, þó ekki hjá öllum.

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Venjulega þolast DACRIOSOL® vel þegar notaðir eru ráðlagðir skammtar, en mjög sjaldan hefur verið greint frá sviða, kláða og öðrum staðbundnum áhrifum eftir markaðssetningu lyfsins.

### 5. HVERNIG Á AÐ GEYMA DACRIOSOL®

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota DACRIOSOL® eftir fyrningardagsetninguna sem tilgreind er á glasinu. Fyrningardagsetning er síðasti dagur þess mánaðar.

Gættu þess að augndropaglassið sé vel lokað og geymdu DACRIOSOL® við stofuhita (15° - 25° C). Þegar líðnar eru 4 vikur frá því þú tókst glassið í notkun skalt þú fleygja því sem kann að vera eftir af lyfinu.

### 6. AÐRAR UPPLÝSINGAR

#### Hvað inniheldur DACRIOSOL®

1 ml af DACRIOSOL® inniheldur: Dextran 70 1,0 mg og hýprómellósu 3,0 mg, benzalkónklóríð 0,1 mg (rotvarnarefni), tvinatriumedetat 0,5 mg (rotvarnarefni), natriumklóríð 7,7 mg, kalíumklóríð 1,2 mg og sæft vatn.

#### Markaðsleyfishafi og framleiðandi

#### SA ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14  
B-2870 Puurs  
Belgia.

#### Umboð á Íslandi

#### K. Pétursson ehf.

Kristnibraut 29  
113 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í ágúst 2007.