

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dacriosol[®] Ukonserveret 1 mg/ml + 3 mg/ml,

øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

Dextran/Hypromellose

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Dacriosol Ukonserveret uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Dacriosol Ukonserveret.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dacriosol Ukonserveret
3. Sådan skal du bruge Dacriosol Ukonserveret
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du skal bruge Dacriosol Ukonserveret ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene).

Det virker ved at fugte og smøre dine øjne samt lindre irritation.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Dacriosol Ukonserveret for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DACRIOSOL UKONSERVERET

Brug ikke Dacriosol Ukonserveret

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dacriosol Ukonserveret

Hvis dine øjne bliver ved med at være irriterede, skal du kontakte lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge Dacriosol Ukonserveret til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige præparater.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Dacriosol Ukonserveret under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Dacriosol Ukonserveret.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dacriosol Ukonserveret kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DACRIOSOL UKONSERVERET

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er


Voksne

1-2 dråber efter behov.


Børn under 15 år

Du må kun bruge Dacriosol Ukonserveret til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Sådan bruger du Dacriosol Ukonserveret korrekt



1. Vask dine hænder, før du bruger Dacriosol Ukonserveret.
2. Sæt dig foran et spejl, så du let kan se, hvad du laver.
3. Åbn folieposen med Dacriosol Ukonserveret og riv en enkeltdosisbeholder af. Vær sikker på, at enkeltdosisbeholderen er intakt før brug.
4. Drej toppen af. Træk ikke.



5. Pas på, at enkelt dosisbeholderens spids ikke rører noget, da det kan forurene øjendråberne.
6. Hold enkelt dosisbeholderen med spidsen nedad mellem din tommel- og pegefinger.
7. Brug pegefingern fra den anden hånd til at trække øjenlåget nedad, indtil der dannes en "lomme" mellem øjenlåget og dit øje.
8. Placer enkelt dosisbeholderens spids tæt på øjet, uden at røre øjet, og tryk forsigtigt på enkelt dosisbeholderen, indtil en eller to dråber falder ned i "lommen" mellem øjet og det nedre øjenlåg.
9. Slip det nedre øjenlåg og blink få gange for at være sikker på, at hele øjet er dækket af opløsningen.
10. Brug rester af opløsningen til det andet øje ved at gentage trin 6-9. Hvis der derimod ikke er mere opløsning tilbage i enkelt dosisbeholderen, så gentag trin 4-9 med en ny enkelt dosisbeholder.
11. Smid enkelt dosisbeholderen væk umiddelbart efter brug. Gem eller genbrug ikke en åben enkelt dosisbeholder. Alle 4 enkelt dosisbeholdere fra en foliepose skal bruges, inden 4 dage efter folieposen er åbnet.

Hvis du har brugt for mange Dacriosol Ukonserveret

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Dacriosol Ukonserveret, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Dacriosol Ukonserveret.

Hvis du har glemt at bruge Dacriosol Ukonserveret

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan. Brug aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dacriosol Ukonserveret kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Smerter i øjet, kløende eller rødt øje, unormal følelse i øjet, sløret syn, trøtte øjne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Dacriosol Ukonserveret utilgængeligt for børn.
- Du skal opbevare Dacriosol Ukonserveret i original emballage.
- Brug ikke Dacriosol Ukonserveret efter den udløbsdato, der er angivet på kartonen, folieposen og enkelt dosisbeholderen.
- Brug alle uåbnede enkelt dosisbeholdere fra den enkelte foliepose senest 4 dage efter åbning af folieposen første gang.
- Gem ikke åbnede Dacriosol Ukonserveret enkelt dosisbeholdere.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dacriosol Ukonserveret 1 mg/ml + 3 mg/ml, øjendråber indeholder

- Aktive stoffer: Dextran 70 og hypromellose.
- Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, kaliumchlorid, calciumchloriddihydrat, magnesiumchlorid, zinkchlorid, natriumhydrogencarbonat, kuldioxid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Pakningsstørrelse

Enkelt dosisbeholder (polypropylen (LDPE)) indeholdende 0,4 ml.

Pakningen indeholder syv aluminiumsposer med fire enkelt dosisbeholdere i hver enkelt pose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratories Alcon SA
23 Avenue Georges Ferrenbach
B.P. 83
F-68240 Kaysersberg
France

Fremstiller

Laboratories Alcon SA
23 Avenue Georges Ferrenbach
B.P. 83
F-68240 Kaysersberg
France

Repræsentant i Danmark

Alcon Danmark A/S
Rødovre Parkvej 25
2610 Rødovre
Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008

Alcon[®]

425691