

Petidin DAK 25 mg tabletter

Pethidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Petidin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Petidin DAKs virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Petidin DAK
3. Sådan skal du tage Petidin DAK
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Petidin DAK
6. Yderligere oplysninger

1. Petidin DAKs virkning og hvad du skal bruge det til

Petidin DAK er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Petidin DAK

Tag ikke Petidin DAK, hvis du:

- er overfølsom over for pethidin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- tager eller inden for de sidste 2 uger har taget medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
- har forhøjet tryk i hjernen (for eksempel på grund af slag mod kraniet)
- har nedsat vejrtrækning

Vær ekstra forsigtig med at tage Petidin DAK

Tal med lægen inden du tager Petidin DAK, hvis du:

- har vejrtrækningsbesvær, astma eller rygerlunger (KOL)
- har tendens til kramper
- har forstyrrelser i hjerterytmen
- har pludseligt opståede mavesmerter
- har en arvelig blodmangel-sygdom (seglcelleanæmi)
- har for lavt stofskifte
- har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom)
- har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom)
- har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring
- har kronisk lever- eller nyresygdom
- er over 65 år

Du skal være opmærksom på, at du kan blive afhængig af Petidin DAK.

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Petidin DAK er optaget på dopinglisten.

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Petidin DAK, eller Petidin DAK kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

- medicin mod mavesår og for megen mavesyre (cimetidin)
- medicin mod virusinfektioner (aciclovir)
- medicin mod HIV (ritonavir)
- anden medicin mod stærke smerter eller alkoholmisbrug (opioider)
- medicin mod krampes (chloralhydrat)
- beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)
- muskelafslappende medicin
- medicin mod psykoser (phenothiaziner)
- visse typer af medicin mod depression og Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
- medicin mod epilepsi (phenytoin, fosphenytoin)
- medicin mod fedme (sibutramin)

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Petidin DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Petidin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Petidin DAK, da alkohol forstærker den sløvende virkning af Petidin DAK.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, eller når du ammer, må du kun tage Petidin DAK efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Petidin DAK kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Petidin DAK

Petidin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Petidin DAK

Tag tabletten med rigelig væske.

Voksne: 4 – 8 tabletter hver 3. – 4. time. Dosis tilpasses individuelt efter lægens anvisning.

Ældre over 65 år: Dosis nedsættes efter lægens anvisning.

Børn over 4 år: 0,5 mg – 2 mg pr. kg legemsvægt hver 3. – 4. time. Dosis tilpasses individuelt efter lægens anvisning.

Du må kun bruge Petidin DAK 25 mg tabletter til børn under 4 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller ophør af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Petidin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Petidin DAK, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Petidin DAK kan være slap muskulatur, kold og klam hud, af og til langsom puls og lavt blodtryk. Vejrtrækningsbesvær, søvntrang, der kan føre til ekstrem sløvhed og koma. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop og død.

Hvis du har glemt at tage Petidin DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Petidin DAK

Rådfør dig med lægen hvis du ønsker at afslutte behandlingen. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer.

4. Bivirkninger

Petidin DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed, besvimelse, uklarhed, sløvhed, kvalme, opkastninger, humørsvingninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Muskelkramper og krampeanfald (alvorlig), vejrtrækningsbesvær (alvorlig), abstinenssymptomer hos spædbørn af mødre, der har taget pethidin under graviditeten (bl.a. rastløshed, opkastning, øget appetit, irritabilitet og rysten) (alvorlig), galdevejskramper, hurtig puls, langsom puls, hjertebanken, rysten, mundtørhed, forstoppelse, nældefeber, forvirring, psykisk og fysisk afhængighed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Hallucinationer (alvorlig).

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre, ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i indlægssedlen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Petidin DAK

Opbevar Petidin DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Petidin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Petidin DAK 25 mg tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er pethidinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Petidin DAK er runde, hvide tabletter med delekærv.

Petidin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret februar 2008