



45632-0



Timolol Alcon

Øjendråber, opløsning
2,5 mg/ml og 5,0 mg/ml

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge Timolol Alcon øjendråber.

- Gem denne information; du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Timolol Alcon øjendråber til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som skal læses, før du bruger Timolol Alcon
3. Sådan skal du bruge Timolol Alcon
4. Mulige bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere Information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Timolol Alcon anvendes til at behandle åbenvinklet glaucom (forhøjet tryk i øjet)

Timolol Alcon sænker trykket i øjet, hovedsageligt ved at mindske produktionen af kammervand. Virkningen indtræffer normalt hurtigt, ca. 20 minutter efter at du har dryppet opløsningen i øjet. Tryksænkningen er størst indenfor 1-2 timer og kan vare op til 24 timer. Det kan tage op til 4 uger inden trykket stabiliseres.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM SKAL LÆSES FØR DU BRUGER TIMOLOL ALCON

Brug ikke Timolol Alcon hvis

- du er overfølsom overfor timololmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har lidt, eller lider, af astma eller åndedrætsbesvær af anden årsag.
- hvis du har ubehandlet hjertesvigt, alvorlig hjerteblok eller nedsat hjertefunktion.

Særlige forholdsregler

- Timolol Alcon øjendråber må ikke bruges, mens der bæres bløde kontaktlinser. Vent mindst 10 – 15 minutter efter drypning før du sætter dine kontaktlinser på øjet.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Timolol Alcon

- Timolol Alcon indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid), som kan påvirke/misfarve bløde kontaktlinser.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

- Graviditet: Må kun anvendes efter lægens anvisning.
- Amning: Timolol Alcon udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timolol Alcon kan, som andre øjendråber, give sløret syn umiddelbart efter drypning. Dette kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vent med at køre bil eller betjene maskiner indtil dit syn er klart igen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Det er specielt vigtigt at informere lægen om brug af medicin for regulering af blodtryk eller hjertelidelse. Du bør kontakte lægen, hvis du skal gennemgå en øjenoperation, får en øjeninfektion eller andre øjenproblemer. Forsigtighed bør udvises ved vanskeligt regulerbar sukkersyge. Der er mulighed for systemisk påvirkning.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE TIMOLOL ALCON

Dosering

1 dråbe 2,5 mg/ml i det angrebne øje 2 gange daglig. Hvis effekten ikke er tilstrækkelig, kan lægen ændre doseringen til 5 mg/ml 2 gange dagligt.

Børn: Timolol Alcon må kun anvendes til børn efter lægens anvisning.

Hvis du anvender andre øjendråber, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Timolol Alcon og de andre dråber.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

0906

45632-0



v2	Alcon® BELGIUM	45632-0
140 x 210 / 140 x 22 mm	Timolol Alcon 2,5mg/ml - 5mg/ml	
recto-verso	DKI	
AANTAL KLEUREN : 1	JDB / 30.10.2006	

**Hvordan bruger jeg Timolol Alcon korrekt:**

1. Vask hænder og sæt dig foran et spejl.
2. Skru låget af flasken.
3. Pas på at flaskens spids ikke berører noget, da indholdet så kan blive forurenet.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel- og langfinger.
5. Læn hovedet tilbage og træk det nedre øjenlåg nedad på det relevante øje ved hjælp af den anden hånds pegefinger.
6. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den berører dette. Tryk let på flaskens bund med pegefingeren, så det antal dråber lægen har ordineret falder ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.
7. Slip nu det nederste øjenlåg og luk øjet i 1-2 minutter, så lægemidlet lettere optages.
8. Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin 5 - 7.
9. Til sidst skrues låget på flasken.
10. Vask hænderne igen for at fjerne evt. medicinrester.

Har du taget for meget Timolol Alcon?

- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Timolol Alcon, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet.
- Da der er begrænset plads i øjet, er overdosering yderst sjælden.
- Drikkes Timolol Alcon, eller dryppes der med for mange dråber af Timolol Alcon, kan der opleves svimmelhed og utilpashed.

Har du glemt at tage Timolol Alcon?

- Genoptag behandlingen med det samme og fortsæt derefter i det normale mønster. Anvend aldrig dobbeltdosis som erstatning for glemte doser.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Timolol Alcon kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ingen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (1-10 ud af 100 patienter risikerer at få bivirkninger)

Øjenirritation, sløret syn

Ikke almindelige bivirkninger (1-10 ud af 1000 patienter risikerer at få bivirkninger)

Svimmelhed og depression, træthed og hovedpine, kortåndethed, svækket åndedræt og almindelig utilpashed.

Sjældne bivirkninger (1-10 ud af 10.000 patienter risikerer at få bivirkninger).

Dobbeltsyn, hængende øjenlåg, nedsat følsomhed på hornhinden, hjerneblødning, hjertebanken, uregelmæssigt hjerteslag, langsom hjerterytme, bryst smerter, nedsat hjertefunktion, hjertestop, sammentrækning af luftvejene (især hos patienter med eksisterende luftvejssygdomme) og overfølsomhedsreaktioner.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5. OPBEVARING AF TIMOLOL ALCON ØJENDRÅBER

- Timolol Alcon øjendråber skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevares i original emballage, da lægemidlet er følsomt over for lys.
- Efter åbning skal Timolol Alcon anvendes inden 4 uger.
- Anvend ikke Timolol Alcon efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Timolol Alcon indeholder:

- Timolol Alcon øjendråber, opløsning, 2,5 mg/ml og 5,0 mg/ml.
- Det aktive indholdsstof i Timolol Alcon er timololmaleat.
- De øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumhydroxid og sterilt vand.

Markedsføres i Danmark af:

Dansk repræsentant/information:

Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25, 2610 Rødovre,

Markedsføringsindehaver og fremstiller:

SA Alcon Couvreur NV

Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien.

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Seneste revision af denne indlægsseddel:

August 2006



v2	Alcon[®] BELGIUM	45632-0
140 x 210 / 140 x 22 mm	Timolol Alcon 2,5mg/ml - 5mg/ml	
recto-verso	DKI	
AANTAL KLEUREN : 1	JDB / 30.10.2006	