

Indlægsseddel: Information til brugeren

Venoruton 300 mg hårde kapsler Hydroxyethylrutosider

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Venoruton nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venoruton
3. Sådan skal du tage Venoruton
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Venoruton anvendes til behandling af hæmorroider og af væskeophobning (ødem) og andre symptomer på venøse kredsløbsforstyrrelser.

Venoruton nedsætter tendensen til ophobning af væske i vævene ved hævelser i benene. Virkningen af Venoruton indtræder gradvis i løbet af 14 dage og er fuldt effektiv efter 4 ugers behandling.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venoruton

Tag ikke Venoruton

- hvis du er allergisk over for hydroxyethylrutosider eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Venoruton:

- Hvis du har væskeophobninger (ødemer) i benene, pga. hjerte-, lever- eller nyre-sygdomme, skal du ikke bruge Venoruton, da effekten ikke er påvist i disse indikationer.

Børn og unge

Venoruton anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Venoruton sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin-/mineralpræparater eller kosttilskud.

Brug af Venoruton sammen med mad og drikke

Venoruton skal tages i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Venoruton kan anvendes under graviditet.

Bør ikke anvendes i første trimester da erfaringsgrundlaget er ringe.

Amning

Venoruton kan anvendes under amning. Der er ikke set bivirkninger hos ammede børn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Venoruton påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

I sjældne tilfælde er træthed og svimmelhed blevet rapporteret ved brug af Venoruton . Hvis patienten bliver påvirket ved brug af Venoruton, anbefales det ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Venoruton

Tag altid Venoruton nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg apotekspersonalets eller sundhedspersonalets.

Den anbefalede dosis til voksne er 1 kapsel (300 mg) 3 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Kapslerne skal synkes hele.

Hvis du har taget for mange Venoruton hårde kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Venoruton hårde kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Børn og unge

Venoruton anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Hvis du har glemt at tage Venoruton

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Venoruton kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Forstyrrelser i mave-tarm-kanalen, luft i maven, diarré, mavesmerter, maveirritation, fordøjelsesforstyrrelser, hududslæt, kløe, nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Overfølsomhedsreaktioner fra kredsløbsshock med væskeophobning, vejrtræknings- og/eller synkebesvær og koma til lettere overfølsomhedsreaktioner. Hovedpine, svimmelhed, træthed. Rødmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Venoruton utilgængeligt for børn.

Brug ikke Venoruton efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Venoruton 300 mg hårde kapsler indeholder:

- Aktivt stof: hydroxyethylrutosider. Hver kapsel indeholder 300 mg hydroxyethylrutosider.
- Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 6000, gelatine, gul jernoxid (E172), titandioxid (E171), natriumlaurylsulfat og rensset vand.

Udseende

Kapslerne er gule og mærket med ”Venoruton 300”.

Pakningsstørrelser

Findes i pakninger med 100 hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens vej 14
2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2014