




page 1	page 2	page 3	page 4	page 5	page 6	page 7	page 8	page 9	page 10
<p>Bisacor[®] filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg</p> <p>L5379-31</p> <p>Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen</p> <p>Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen</p> <p>Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen</p> <p>Lægen har ordineret Bisacor[®] til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre</p> <p>Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver værre, bliver ved og er generende.</p> <p>Denne information er der oplysninger om:</p> <ol style="list-style-type: none"> Virkning og anvendelse Sådan skal du tage Bisacor[®] Bivirkninger Opbevaring Yderligere information <p>1. Virkning og anvendelse</p> <p>Bisacor[®] er medicin af typen betablokkere.</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Du kan bruge Bisacor[®] til behandling af:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortøjet blodtryk Hjertekramper (angina pectoris). <p>Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.</p> <p>2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Bisacor[®]</p> <p>Tag ikke Bisacor[®], hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> du er overfølsom over for bisoprololhemifumarat, anden medicin af samme type (betablokkere) eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Bisacor[®] du lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb <p style="text-align: center;">3</p>	<ul style="list-style-type: none"> du har uregelmæssig eller langsom puls du har lavt blodtryk du lider af astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger) du har nedsat blodomløb, som giver "hvide" eller "døde" fingre eller tæer du får smerter i benene, når du går, på grund af dårligt kredsløb du har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom). <p>Særlige forholdsregler</p> <p>Du må ikke selv stoppe behandlingen med Bisacor[®] pludseligt. Du</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p>skal stoppe behandlingen i løbet af 1-2 uger ved gradvist at nedsætte dosis i samråd med din læge.</p> <p>Fortæl altid lægen, at du tager Bisacor[®], hvis du skal bedes, eller du skal have indsprøjet kontrastmiddel ved røntgenundersøgelse.</p> <p>Tal med din læge, hvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> du har diabetes. Bisacor[®] kan skjule og forlænge symptomerne på lavt blodglukose (hypoglykæmi) du har kolde hænder og fødder og snurren i fingre og tæer (Raynauds syndrom) du har smerter i benene, når du går, på grund af åreforkalkning (Claudicatio intermittens) <p style="text-align: center;">5</p>	<ul style="list-style-type: none"> du lider af en stofskiftesygdom (tyrotoksikose) du har en alvorlig leversygdom du faster du lider af voldsom allergi eller har haft en alvorlig allergisk reaktion du lider af hjertekramper (Pritzmetals Angina) du har eller har haft psoriasis, eller du har familiedlemmer, som har psoriasis. <p>Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bisacor[®].</p> <p>Doping: I visse sportsgrene vil forekomsten af bisoprolol i urinen ved kontrol medføre diskvalifikation af den sportsudøvende.</p> <p style="text-align: center;">6</p>	<p>Brug af anden medicin</p> <p>Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.</p> <p>Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:</p> <ul style="list-style-type: none"> migræne (ergotamin, clonidin) alzheimers sygdom (galantamin, donepezil, rivastigmin) nedsat muskelkraft, myasthenia gravis (pyridostigmin) forhøjet tryk i øjet, grøn stær (pilocarpin) diabetes. Bisacor[®] kan skjule og forlænge symptomerne på for lavt <p style="text-align: center;">7</p>	<ul style="list-style-type: none"> blodglukose (hypoglykæmi) depression og psykoser (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere) infektion (rifampicin) malaria (meflochin) binyrebarkhormon (kortikosteroider) gigt eller smerter (NSAID) epilepsi (phenobarbital, primidon) muskel spasmer (baclofen) voldsomme allergiske reaktioner (Epi-pen med adrenalin). <p>Hvis du tager anden medicin mod for højt blodtryk eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (verapamil, diltiazem,</p> <p style="text-align: center;">8</p>	<p>methyldopa, guanidin, lidocain, phenytoin, flecainid, propafenon, amiodaron, nifedipin, andre betablokkere – også øjendråber), kan det være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.</p> <p>Brug af Bisacor[®] sammen med mad og drikkevarer</p> <p>Du kan tage Bisacor[®] sammen med mad og drikke.</p> <p>Graviditet og amning</p> <p>Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.</p> <p>Graviditet:</p> <p>Du må kun tage Bisacor[®] efter lægens anvisning.</p> <p style="text-align: center;">9</p>	<p>Advarsel:</p> <p>Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Bisacor[®]. Spørg lægen.</p> <p>Trafik- og arbejdssikkerhed</p> <p>Bisacor[®] kan hos enkelte give bivirkninger som svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især i starten af behandlingen, ved ændring i behandlingen, og hvis du drikker alkohol.</p> <p>Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bisacor[®]</p> <p>Bisacor[®] indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.</p> <p style="text-align: center;">10</p>

page 11	page 12	page 13	page 14	page 15	page 16	page 17	page 18	page 19	
<p style="text-align: center;">outside face</p>  <p style="text-align: center;">tab/g/luce</p>	<p>3. Sådan skal du tage Bisacor[®]</p> <p>Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.</p> <p>Du skal tage tabletterne sammen med et glas vand. Du kan synke tabletterne hele, eller du kan dele eller knuse dem. Du skal tage tabletterne om morgenen.</p> <p>Dosering</p> <p>Voksne:</p> <p>Bisacor[®] tabletter 5 mg: 1-4 tabletter (5-20 mg) 1 gang daglig.</p> <p style="text-align: center;">11</p>	<p>Bisacor[®] tabletter 10 mg: 1/2-2 tabletter (5-20 mg) 1 gang daglig.</p> <p>Børn:</p> <p>Du må ikke give Bisacor[®] til børn.</p> <p>Nedsat nyrefunktion:</p> <p>Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning.</p> <p>Har du taget for mange Bisacor[®]?</p> <p>Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Bisacor[®], end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.</p> <p style="text-align: center;">12</p>	<p>Symptomer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Langsom puls Svimmelhed på grund af lavt blodtryk Mathed, koldsved, sult på grund af lavt blodsukker Vejtrækningsbesvær, astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue Brystsmerter, trykken for brystet, åndedrætsbesvær, besvimmelse. <p>Har du glemt at tage Bisacor[®]?</p> <p>Glemmer du at tage en dosis, skal du bare tage den næste dosis som planlagt. Tag aldrig en dobbelt dosis.</p> <p style="text-align: center;">13</p>	<p>4. Bivirkninger</p> <p>Bisacor[®] kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.</p> <p>Alvorlige bivirkninger</p> <p>Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 patienter):</p> <ul style="list-style-type: none"> Forværring af hjerteproblemer med åndedrætsbesvær, smerte eller trykken i brystet. Meget langsom, evt. uregelmæssig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112 Astmaanfald hos patienter med astma, bronkitis eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Kontakt evt. læge eller skadestue. <p style="text-align: center;">14</p>	<p>Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 patienter):</p> <ul style="list-style-type: none"> Hallucinationer Gulsot. <p>Ikke alvorlige bivirkninger</p> <p>Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 patienter):</p> <ul style="list-style-type: none"> Svimmelhed, hovedpine, træthed, udmatelse (især i starten af behandlingen) Langsom puls Køle, følelseløse hænder og fødder. Hvide fingre og tæer (Raynauds syndrom) Smerter i benene ved gang (claudicatio intermittens) <p style="text-align: center;">15</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kvalme, opkastninger, diarre, mavesmerter, forstoppelse. <p>Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 patienter):</p> <ul style="list-style-type: none"> Depression Søvnforstyrrelser Svimmelhed, når du rejser dig op Muskelsvaghed, kramper, ledsygdom. <p>Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.</p> <p>Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der</p> <p style="text-align: center;">16</p>	<p>står her, så bivirkninger kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.</p> <p>Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.</p> <p>Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.</p> <p>Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk</p> <p>5. Opbevaring</p> <ul style="list-style-type: none"> Opbevar Bisacor[®] utilgængeligt for børn <p style="text-align: center;">17</p>	<ul style="list-style-type: none"> Opbevar ikke Bisacor[®] over 25°C Brug ikke Bisacor[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen. <p>6. Yderligere information</p> <p>Bisacor[®] tabletter 5 mg og 10 mg indeholder:</p> <p>Det virksomme indholdsstof er Bisoprololhemifumarat 5 mg eller 10 mg. De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLISK cellulose, majsstivelse, talcum, natriumlaurylsulfat, kolloid, vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000 samt farvestoffene jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171).</p> <p>Udsæende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opbevar Bisacor[®] 5 mg er lysegule, filmovertrukne tabletter med delekærv. <p style="text-align: center;">18</p>	<p>Bisacor[®] 10 mg er rosa, filmovertrukne tabletter med delekærv.</p> <p>Markedsføring i Danmark:</p> <p>Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.</p> <p>Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.</p> <p>Revideret juni 2008</p> <p style="text-align: center;">19</p>

tab/g/luce	base label	gluce
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Udbeholder Bisacor[®] 10 mg</p>	 <p style="text-align: center;">tab/g/luce</p>	<p>1 tablet indeholder: Bisoprololhemifumarat 10 mg lactose, fæstestof (E171, E172).</p> <p>Må ikke opbevares over 25°C</p> <p>Actavis Nordic A/S Gentofte.</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">MH1113333K</p>

 <p>creating value in pharmaceuticals</p>		<h2>Bisacor 100 mg Tablets - DK</h2>		<p>colours/plates</p> <table border="1"> <tr><td>1. black</td><td>■</td></tr> <tr><td>2. pms 711</td><td>■</td></tr> <tr><td>3. pms 877</td><td>■</td></tr> <tr><td>4. pms 485</td><td>■</td></tr> <tr><td>5.</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td></tr> </table> <p>Non Printing Colours</p> <table border="1"> <tr><td>1. Profile</td><td>■</td></tr> <tr><td>2.</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td></tr> </table>	1. black	■	2. pms 711	■	3. pms 877	■	4. pms 485	■	5.		6.		1. Profile	■	2.		3.	
1. black	■																					
2. pms 711	■																					
3. pms 877	■																					
4. pms 485	■																					
5.																						
6.																						
1. Profile	■																					
2.																						
3.																						
<p>t 0044 1271 311400</p> <p>f 0044 1271 311449</p> <p>@ artworkstudio@actavis.co.uk</p> <p>isdn 0044 1271 327411</p>	<p>item no: L5379-31</p> <p>print proof no: 2</p> <p>origination date: 1.10.08</p> <p>originated by: db</p> <p>revision date: 9.10.08</p> <p>revised by: db</p>	<p>dimensions: 28 x 105</p> <p>pharmacode:</p> <p>design repeat (single):</p> <p>web:</p> <p>foil pharmacode repeat:</p> <p>Supplier: CCL</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>approved for print/date</p> </div>																			