

Indlægsseddel: Information til brugeren

Abalgin® Retard 150 mg, hårde depotkapsler
Dextropropoxyphenhydrochlorid.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Abalgin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Abalgin Retards virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abalgin Retard
3. Sådan skal du tage Abalgin Retard
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Abalgin Retard
6. Yderligere oplysninger

1. Abalgin Retards virkning og hvad du skal bruge det til

Abalgin Retard er et smertestillende middel, som du kan tage ved svage smerter.

Lægen kan have givet dig Abalgin Retard til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abalgin Retard

Tag ikke Abalgin Retard, hvis du:

- er overfølsom over for dextropropoxyphen eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har alvorlig nyresygdom.
- har selvmordstanker.
- har et medicin- eller alkoholmisbrug.

Du må ikke give Abalgin Retard til børn.

Du må ikke tage Abalgin Retard sammen med alkohol.

Vær ekstra forsigtig med at tage Abalgin Retard

Vær opmærksom på, at:

- Abalgin Retard kan være livsfarligt, hvis du tager højere doser end lægen har foreskrevet eller tager det sammen med alkohol.
- Abalgin Retard kan virke vanedannende, hvis du tager højere doser end lægen har foreskrevet over længere tid.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Abalgin Retard.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager:

- medicin mod for højt blodtryk (propranolol og metoprolol).
- medicin mod HIV virus (ritonavir).
- beroligende medicin.
- muskelafslappende medicin.
- medicin mod depression.
- sovemedicin.
- medicin mod epilepsi (carbamazepin).
- medicin mod stærke smerter eller til behandling af misbrug (opioider).

Vær opmærksom på, at dette også kan gælde for medicin, som du har taget for nogle dage siden, eller som du skal tage inden for de næste dage.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Brug af Abalgin Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Abalgin Retard med et glas vand.

Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Abalgin Retard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Abalgin Retard efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Abalgin Retard, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Abalgin Retard virker sløvende og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Abalgin Retard

Abalgin Retard indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Abalgin Retard

Du skal tage kapslerne hele med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 depotkapsel 2 - 3 gange daglig.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn: Børn må ikke få Abalgin Retard.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Let til moderat nedsat nyrefunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Svært nedsat nyrefunktion: Du må ikke tage Abalgin Retard ved svært nedsat nyrefunktion.

Hvis du har taget for mange Abalgin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Abalgin Retard, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er sløvhed, bevidstløshed, koma, kramper, hæmmet/sløv vejrtrækning, små pupiller afløst af tiltagende pupiludvidelse, faldende blodtryk, vand i lungerne, kredsløbssvigt samt forstyrrelse i hjerterytmen. Dødsfald kan forekomme.

Hvis du har glemt at tage Abalgin Retard

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Abalgin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Abalgin Retard. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer.

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg igen, efter behandlingen med Abalgin Retard er stoppet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om, eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Abalgin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Krampeanfald ved høje doser. Ring 112.
- Abstinenssymptomer hos spædbørn af mødre, der har taget Abalgin Retard under graviditet: uro, opkastninger, øget appetit, irriteret adfærd, rysten, hyperaktivitet, stoppet næse, kramper og skinger gråd. Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Tinnitus og hørenedsættelse ved høje doser. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Smerter i maven, kvalme.
- Sløvhed, svimmelhed, hovedpine, uklarhed.
- Lavt blodtryk.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Psykisk og fysisk afhængighed af smertestillende medicin. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
- Forstoppelse, opkastning.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Vrangforestillinger. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Gulsot med hudkløe, som går væk igen efter behandlingens ophør. Tal med lægen.
- Desorientering, forvirring, rastløs uro.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Muskelsvaghed.
- Humørsvingninger som opstemthed eller depression.
- Mindre synsforstyrrelser.
- Udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Mæthed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed pga. lavt blodsukker. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan være alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Abalgin Retard kan desuden give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som forhøjede levertal (leverprøver) og stofskifteændringer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under ”bivirkninger” på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Abalgin Retard

Opbevar Abalgin Retard utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Abalgin Retard ved almindelig temperatur.

Tag ikke Abalgin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Abalgin Retard 150 mg hårde depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: dextropropoxyphenhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: acetyltributylcitrat, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), ethylcellulose (E462), gelatine, lactose, vandfri natriumdihydrogenphosphat, paraffin (E 905), povidon (E 1201), vandfri kolloid silica (E 551), talcum (E 553b).

Farvestof: Erythrosin (E 127), indigotin (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Abalgin Retard er en rød kapsel med print ”12” i hvid farve på den ene side.

Abalgin Retard findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dansk Lægemiddelforsyning DLF ApS

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Revideret Februar 2008