



Information om

Captopril Actavis, 25mg og 50mg tabletter

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Captopril Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Captopril Actavis
3. Sådan skal du tage Captopril Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

Captopril Actavis 25 mg og 50 mg tabletter

- Det aktive stof er captopril 25 mg eller 50 mg
- De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, præglatiniseret stivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose og stearinsyre

Udseende

Tabletter 25 mg: Hvide, runde, flade 8 mm tabletter med delekræV på den ene side

Tabletter 50 mg: Hvide, runde, flade 10 mm tabletter med delekræV på den ene side

Markedsføring i Danmark:

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

1. Virkning og anvendelse:

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Captopril Actavis er en ACE-hæmmer, som hæmmer dannelsen af visse blodtryksforøgende hormoner og normaliserer udskillelsen af salt og vand gennem nyrerne. Dette medfører også en mindsket arbejdsbelastning på hjertet ved nedsat hjertemuskel funktion efter hjerteinfarkt samt ved hjertesvigt. Hos diabetespatienter mindsker captopril udskillelsen af proteiner i urinen og forsinket forringelsen af nyrefunktionen.

Selv om den blodtryksnedsættende virkning af Captopril Actavis hurtigt sætter ind, øges effekten gradvist. Fuld effekt opnås først efter flere ugers behandling.

Captopril Actavis anvendes til behandling af forhøjet blodtryk, hjertesvigt, nedsat arbejdskapacitet i hjertets muskulatur efter hjerteinfarkt og nedsat nyrefunktion hos diabetespatienter.

2. Vigtig information som du skal læse, inden du bruger Captopril Actavis

Du bør ikke tage Captopril Actavis:

- ved overfølsomhed over for captopril, nogle af de øvrige indholdsstoffer eller andre ACE-hæmmere
- ved tidligere angioødem (en allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, mund, arme og ben) under tidligere behandling med ACE-hæmmere
- hvis du er i anden og tredje trimester (4-9 måned) af graviditet
- hvis du ammer

Vær særlig forsigtig med at anvende Captopril Actavis:

- hvis du har forhøjet blodtryk forårsaget af forsnævring af nyrernes pulsårer, nedsat nyrefunktion, forsnævring af legemspulsårer eller fortykket hjertemuskulvæg
- hvis du behandles med vanddrivende medicin, er på streng saltfattig diæt eller er i dialysebehandling
- informer altid lægen, hvis du får symptomer på lavt blodtryk, fx. svimmelhed eller besvimmelse
- ved narkosebehandling og kirurgiske indgreb skal lægen også informeres om, at du er i behandling med Captopril Actavis
- hvis du har nedsat nyrefunktion
- hvis du har kollagen bindevævssygdom fx.. systemisk lupus erythematosus (SLE)
- hvis du behandles med lægemidler som kan påvirke de hvide blodlegemer eller kroppens immunforsvar
- hvis du behandles med allopurinol, procainamid eller litium (se også Indtagelse af andre lægemidler)
- hvis du bliver behandlet for overfølsomhed (hyposensibilisering) overfor insektstik, da samtidig behandling kan medføre allergiske reaktioner
- hvis du får gulsot

Brug af Captopril Actavis sammen med mad og drikkevarer:

Captopril Actavis kan tages før, under og efter måltider

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Risiko for fosterskader. Anvend derfor ikke Captopril Actavis under graviditet.

Amning:

Captopril Actavis må ikke anvendes under amning.

Bilkørsel og betjening af maskiner:

Evnen til at føre bil og betjene maskiner kan være nedsat, særlig i begyndelsen af behandlingen, når doseringen ændres. Undlad at køre bil eller betjene maskiner før du ved, hvordan du reagerer på Captopril Actavis

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Captopril Actavis:

Captopril Actavis indeholder lactosemonohydrat og bør derfor ikke anvendes af personer med nogen af følgende sjældne arvelige sygdomme; glucose- og galactosemalabsorption eller lactasemangel syndrom

L1677-30



t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk
isd 0044 1271 327411

**MOCK UP
ONLY**

Captopril Pil (Denmark)

item no: L1677-30

print proof no: 02

origination date: 28/02/07

originated by: R.Wrey

revision date: 07/03/07

revised by: R.WREY

dimensions: 148x250mm

pharmacode:

design repeat (single):

web:

colours/plates:

Black

Brug af anden medicin:

Virkningen af Captopril Actavis kan påvirkes ved samtidig indtagelse af andre lægemidler, ligesom virkningen af andre lægemidler kan påvirkes af Captopril Actavis (se også 'Særlige forholdsregler')

Vær opmærksom på at dette også kan gælde medicin som du har brugt for flere dage siden eller som du skal bruge inden for de næste dage.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Eksempler på lægemidler som kan påvirke eller påvirkes af behandling med captopril er:

- kaliumbesparende vanddrivende midler (fx. spironolacton, triamteren eller amilorid) eller kaliumtilskud
- vanddrivende midler (diuretika)
- andre blodtryksænkende lægemidler (fx. betablokkere og langtidsvirkende calciumkanal-blokkere)
- nitroglycerin eller andre nitrater (mod hjertekrampe)
- lithium (mod maniodepressiv sygdom)
- tricykliske antidepressiva/antipsykotika (mod depression eller andre psykiske problemer)
- allopurinol (middel mod urinsyreigt)
- procainamid (middel mod hjertekramper)
- cytostatika (midler mod kræft)
- immunosuppressive stoffer (midler til undertrykkelse af immunforsvaret)
- ikke-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) (smertestillende og betændelseshæmmende lægemidler)
- sympatomimetika (stoffer der påvirker en særlig del af centralnervesystemet)
- antidiabetika (insulin og tabletter mod sukkersyge)
- Captopril Actavis kan give falsk positiv urintest for acetone

3. Sådan skal du tage Captopril Actavis:

Captopril Actavis bør altid tages i nøje overensstemmelse med din læges instruktioner. Du bør konsultere din læge eller apotek, hvis du er usikker. Dosis skal bestemmes af lægen, som tilpasser den individuelt til dig. Indbefalet maksimal dosis er 150 mg daglig.

Den almindelige dosis er:
Forhøjet blodtryk:
Anbefalet startdosis er 25-50 mg daglig fordelt på to doser. Dosis kan derefter øges gradvist til 100-150 mg daglig. Ofte anvendes et vandrivende middel sammen med Captopril Actavis.

Hjertesvigt:
6,25-12,5 mg 2-3 gange daglig, dosis kan derefter øges gradvis til 75-150 mg daglig.

Forebyggende behandling efter hjerteinfarkt:
Først gives en testdosis på 6,25 mg (man må benytte et andet præparat, da dette præparat ikke findes i denne styrke).
Hvis der ikke er symptomer på lavt blodtryk fortsætter behandlingen med 12,5 mg som gradvis øges efter lægens anvisning. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 75-150 mg fordelt på 2-3 doser.

Nedsat nyrefunktion:
Ved nedsat nyrefunktion kan kroppen ikke udskille captopril ligeså effektivt som normalt, og lægen kan derfor eventuelt foreskrive lavere doser end de ovenfor nævnte.

Nyresygdom på grund af diabetes:
75-100 mg daglig fordelt på flere doser.

L1677-30

Har du taget for mange Captopril Actavis?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Captopril Actavis tabletter end der står i denne information eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis du glemmer at tage Captopril Actavis:

Hvis en enkelt dosis glemmes, indtages den næste dosis i sædvanlig mængde.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkelt doser
Ved forglemmelse af flere doser bør du straks søge læge.

4. Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Captopril Actavis give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Tør, irritativ (ikke-produktiv) hoste og åndenød.
Søvnforstyrrelser og svimmelhed. Smagsforandringer.
Kvalme, opkastning, maveirritationer, mavesmerter, diaré, forstoppelse, mundtørhed. Kløe med eller uden udslet, udslet og tab af håret. Kontakt lægen, hvis hududslettet ikke forsvinder i løbet af nogle dage.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hævelser af ben, arme, tunge, slimhinder, lunger og stemmebånd. Brystmerter, træthed og ubehag.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Anoreksi, døsighed, hovedpine og føleforstyrrelser i huden. Hjerteranken og andre hjerteproblemer, angina pectoris. Lavt blodtryk, rødme, bleghed. Betændelse i munden. Nedsat nyrefunktion inklusiv nyresvigt. Æggehvidestof i urinen. Hyppig vandladning.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Påvirkning af blodparametre. Forhøjet kalium i blodet. Lavt blodsukker. Forvirring, depression. Hjerneblødning (stroke). Svimmelhed. Sløret syn. Hjertestop.
Sammentrækning af muskulaturen i bronkierne, bihulebetændelse. Betændelse i tunge og bugspytkirtel. Mavesår. Leverpåvirkninger inklusiv gulsot. Allergiske reaktioner som kan vise sig som nældefeber, muskelsmerter og feber. Overfølsomhed overfor lys. Slimhinde- og hudinfektioner med feber. Muskel og ledsmerter.
Nyrepåvirkning. Impotens og forstørrelse af brysterne hos mænd.

Hvis du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du oplyse din læge eller apotek herom.

5. Opbevaring

Må ikke opbevares over 25°C.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken.
Af miljø- og sikkerhedshensyn bør ubrugt eller for gammel medicin afleveres på apoteket til destruktion.

6. Yderligere information

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16
2820 Gentofte

Denne indlægsseddel er senest revideret: februar 2007



t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk
isd 0044 1271 327411



Captopril Pil (Denmark)

item no: L1677-30	dimensions: 148x250mm	colours/plates:
print proof no: 01	pharmacode:	Black
origination date: 28/02/07	design repeat (single):	
originated by: R.Wrey	web:	
revision date:07/03/07		
revised by:R.WREY		