

## INDLÆGSSEDDEL INFORMATION TIL BRUGEREN

### **Fluoxetin Alternova, 20 mg, opløselige tabletter** Fluoxetin (som hydrochlorid)

#### **Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen**

- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Lægen har ordineret Fluoxetin Alternova til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på **[www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)**.

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide før, du begynder at tage Fluoxetin Alternova
3. Sådan skal du tage Fluoxetin Alternova
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Fluoxetin Alternova er et lægemiddel som tilhører gruppen af selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI) der virker på centralnervesystemet og øger mængden af serotonin i hjernen.

#### **Voksne:**

- Svære depressive episoder
- Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
- Bulimi (spiseforstyrrelser): Fluoxetin Alternova bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.

#### **Børn og unge over 8 år:**

- Moderat til svær depression, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin Alternova bør kun anvendes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Lægen kan have givet dig Fluoxetin Alternova for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

### **2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUOXETIN ALTERNOVA**

**Tag ikke Fluoxetin Alternova hvis:**

Du er overfølsom (allergisk) over for fluoxetin eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetin Alternova. Overfølsomhed kan vise sig ved udslæt, kløe, hævelse af ansigt eller læber, eller åndenød. Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du ophøre med at tage Fluoxetin Alternova og kontakte lægen eller skadestuen.

Behandling med fluoxetin må først starte to uger efter, at du er holdt op med at tage en irreversibel MAO-hæmmer. Behandling med fluoxetin kan dog startes dagen efter, at du er holdt op med at tage en bestemt type af MAO-hæmmere, der kaldes reversible MAO-hæmmere (f.eks. moclobemid).

Du må ikke tage nogen MAO-hæmmere før 5 uger efter, at du er stoppet med at tage Fluoxetin Alternova. Hvis du har fået Fluoxetin Alternova i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne. Eksempler på MAO-hæmmere er: nialamid, iproniazid, selegelin, moclobemid, phenelzin, tranylcypromin, isocarboxazid og toloxaton.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Fluoxetin Alternova og kontakt lægen**

- Hvis du får udslæt eller andre symptomer på overfølsomhed (såsom kløe, hævede læber eller ansigt, eller åndenød) skal du straks holde op med at tage Fluoxetin Alternova og kontakte læge eller skadestue.
- Hvis du har nedsat leverfunktion. Det kan være nødvendigt, at din læge justerer din dosis.
- Hvis du tidligere har haft krampeanfald eller lider af epilepsi. Hvis du får et krampeanfald, eller oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Alternova.
- Hvis du tidligere har haft manisk periode, eller hvis du oplever en manisk periode skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Alternova.
- Hvis du har en hjertesygdom.
- Hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre.
- Hvis du har problemer med vægttab, da Fluoxetin Alternova kan give vægttab
- Hvis du har sukkersyge (diabetes), da blodsukkerindholdet kan påvirkes af Fluoxetin Alternova. Det kan være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden diabetesbehandling.
- Hvis du har let ved at bløde.
- Hvis du får blodfortyndende medicin (fx warfarin) eller andre lægemidler der fortynder blodet (fx clozapin, phenothiazin, acetylsalicylsyre) eller beroligende lægemidler, der hører til gruppen af tricycliske antidepressiva, eller smertestillende lægemidler af typen NSAID.
- Hvis du bliver behandlet med elektrokonvulsiv terapi (ECT).
- Hvis du anvender naturlægemidler indeholdende perikum (*hypericum perforatum*).
- Hvis du anvender andre lægemidler der øger mængden af serotonin (fx L-tryptofan) og/eller neuroleptika.

- Hvis du begynder at få feber, muskelstivhed- eller rystelser, ændringer i din psykiske tilstand, som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det man kalder "serotonin-syndrom" eller "neuroleptisk malignt syndrom". Selvom dette syndrom forekommer sjældent, kan det medføre livstruende tilstande. Kontakt din læge omgående. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin Alternova.
- Hvis du er yngre end 18 år, da der i denne aldersgruppe kan forekomme selvmordsforsøg, selvmordstanker, aggressiv adfærd og vrede.

### **Hvis du har selvmordstanker og forværring af din depression eller angst.**

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, oftest omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.**

**Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende** om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

### **Rastløshed/besvær med at sidde eller stå stille**

I de første uger af behandlingen kan du få symptomer, såsom rastløshed, hvor du for eksempel ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). Hvis dosis bliver øget, kan det forværre disse symptomer. Kontakt straks lægen, hvis du oplever sådanne symptomer.

### **Anvendelse til børn og unge under 18 år**

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede), når de behandles med denne type medicin. Fluoxetin Alternova bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af svære depressive episoder i kombination med samtaleterapi. Fluoxetin Alternova bør ikke anvendes til andre indikationer.

I denne aldersgruppe er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen med Fluoxetin Alternova, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling.

På trods af dette kan din læge udskrive Fluoxetin Alternova til patienter under 18 år mod svære depressive episoder i kombination med samtaleterapi, hvis lægen beslutter, at det er i patientens bedste interesse. Hvis din læge har udskrevet Fluoxetin Alternova til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør

fortælle din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Fluoxetin Alternova.

Fluoxetin Alternova må ikke anvendes til børn under 8 år.

Vægttab kan forekomme hos patienter, der tager Fluoxetin Alternova.

### **Afvænnings symptomer efter endt behandling med Fluoxetin Alternova**

Du kan få afvænnings symptomer, når du stopper behandlingen med Fluoxetin Alternova, særligt hvis behandlingen afsluttes brat (se afsnittet "Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Alternova").

### **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Vær opmærksom på, at dette også kan gælde for medicin, som du har brugt for flere dage siden, eller som du skal bruge inden for de næste dage.

Visse andre lægemidler kan påvirke behandlingen hvis de tages sammen med Fluoxetin Alternova. Tal med din læge, hvis du tager:

- Lægemidler der indeholder flecainid og encainid (for uregelmæssig hjerterytme), carbamazepin (mod epilepsi) og tricicliske antidepressiva (mod depression f.eks. imipramin, desipramin og amitriptylin), da dosis af disse bør nedsættes også selv om det er op til fem uger siden du har taget Fluoxetin Alternova
- Visse MAO- hæmmere (midler mod depression) (såsom isocarboxacid). Ikke selektive MAO-hæmmere og MAO-hæmmere type A (moclobemid) bør ikke bruges sammen med Fluoxetin Alternova, da der kan opstå alvorlige livstruende bivirkninger (serotonin-syndrom) (se "Tag ikke Fluoxetin Alternova"). Visse MAO-hæmmere type B (selegelin) kan bruges sammen med Fluoxetin Alternova, hvis din læge overvåger din tilstand nøje.
- Fenytoin (mod epilepsi) da Fluoxetin Alternova kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet. Det kan derfor være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt, og derefter følger behandlingen nøje, når du behandles med Fluoxetin Alternova.
- Clozapin (til behandling af bestemte sindslidelser), tramadol (mod smerter) eller triptaner (mod migræne) da disse kan give "serotonin-syndrom" (se afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at tage Fluoxetin Alternova ") samt risiko for hjertekramper og øget blodtryk.
- Lithium eller tryptophan; der er en øget risiko for serotonin-syndrom, når disse lægemidler gives sammen med Fluoxetin Alternova. Når fluoxetin gives i kombination sammen med lithium vil din læge følge din tilstand nøje.
- Warfarin (blodfortyndende) der kan øge risikoen for blødning. Hvis behandlingen af Fluoxetin Alternova startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at tage nogle prøver.
- Elektrokonvulsiv terapi (ECT) da dette kan forlænge krampeanfald

- Prikbladet perikum (Hypericum perforatum, et naturlægemiddel) da disse kan øge bivirkningerne.

### **Brug af Fluoxetin Alternova sammen med mad og drikke**

Du kan tage Fluoxetin Alternova sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.

Du kan enten synke tabletten på normal vis eller tabletten kan opløses i et glas vand.

Du bør undgå at drikke alkohol, mens du tager denne medicin.

### **Graviditet og amning:**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### **Graviditet:**

Tal med lægen med det samme, hvis du er gravid, formoder at være gravid eller planlægger at blive det.

Nogle undersøgelser har vist en øget risiko for medfødte misdannelser af hjertet hos nyfødte, hvor moderen indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin under den tidlige del af graviditeten. I samråd med din læge skal I bestemme, om det er bedst for dig, at stoppe med at tage Fluoxetin Alternova mens du er gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge mener det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin Alternova.

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Fluoxetin Alternova. Når medicinen som Fluoxetin Alternova tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

#### **Amning:**

Hvis du ammer, må du ikke tage Fluoxetin Alternova, da Fluoxetin Alternova går over i modermælken, og kan give bivirkninger hos barnet. Hvis amningen fortsættes, bør lægen nedsætte din dosis af fluoxetin. Tal med lægen.

#### **Fertilitet:**

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Fluoxetin Alternova kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på hvordan medicinen virker på dig.

### 3. SÅDAN SKAL DU TAGE FLUOXETIN ALTERNOVA

Tag altid Fluoxetin Alternova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

#### *Indtagelsesmåde:*

- Du kan enten synke tabletterne på normal vis med et glas vand. Eller du kan også opløse tabletterne i et glas vand. Du skal drikke vandet med det samme og du skal drikke hele portionen. Du må ikke tygge tabletterne.
- Dosis kan tages som én enkelt dosis en gang om dagen, eller deles i flere doser. Du kan tage dosis på et hvilket som helst tidspunkt af dagen. Du kan tage dosis før, under eller efter et måltid eller uafhængigt af et måltid.

#### **Den sædvanlige dosering er:**

##### **Dosering**

##### **Voksne:**

*Depression:* Almindelig dosis er 1 tablet (20 mg) daglig. 3 uger efter, at du er startet i behandling, vil din læge vurdere din dosis, og om nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist øges til maksimalt 3 tabletter (60 mg) daglig, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vigtigt at øge dosis varsomt, for at sikre dig den lavest effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er helt almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er i behandling med denne medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder.

*Ved spiseforstyrrelse (Bulimi):* Almindelig dosis er 3 tabletter (60 mg) daglig.

*Tvangstanker og –handlinger (OCD):* Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt. Din læge vil efter 2 ugers behandling vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det skønnes nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til 3 tabletter (60 mg) daglig. Hvis der ikke er nogen forbedring efter 10 ugers behandling, bør behandlingen med Fluoxetin Alternova vurderes på ny.

**Ældre:** Som for voksne, dog tilrådes forsigtighed ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 2 tabletter (40 mg) daglig. Maksimal anbefalet dosis er 3 tabletter (60 mg) daglig.

##### **Børn og unge fra 8 til 18 år med depression:**

Behandlingen bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er 10 mg dagligt. Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis skal øges forsigtigt for at sikre, at du får den lavest effektive dosis.

Børn med lav kropsvægt skal muligvis have en lavere dosis.

Efter 6 måneders behandling vil lægen vurdere, om du har brug for at fortsætte behandlingen. Hvis du ikke får det bedre, vil lægen revurdere din behandling.

**Nedsat leverfunktion:** Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

**Hvis du har taget for mange Fluoxetin Alternova opløselige tabletter**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fluoxetin Alternova opløselige tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: Kvalme, opkastning, kramper, hjerteproblemer (såsom uregelmæssigt hjerteslag og hjertestop), lungeproblemer og ændring i din mentale tilstand strækkende fra irritation til koma.

**Hvis du har glemt at tage Fluoxetin Alternova**

Hvis du har glemt en dosis opløselige tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis opløselige tabletter, så spring den glemte dosis opløselige tabletter over. Tag aldrig dobbelt dosis.

**Hvis du holder op med at tage Fluoxetin Alternova**

**Du må ikke stoppe med at tage Fluoxetin Alternova, uden at det sker i samråd med din læge.** Det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin, som din læge har ordineret dig, og ikke stopper med behandlingen, selvom du har fået det bedre.

Efter ophør med behandlingen vil det aktive stof forblive i kroppen i nogle uger. Når du stopper med at tage Fluoxetin Alternova kan du opleve abstinenssymptomer såsom: Svimmelhed, snurren, prikkende fornemmelse i huden (såsom prikken og stikken), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svaghed, rystelser, hovedpine, angst og kvalme/opkastning.

De fleste personer oplever, at disse bivirkninger er milde og forsvinder af sig selv inden for få uger. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, når du stopper behandlingen.

Når du skal stoppe med behandlingen af Fluoxetin Alternova, vil din læge hjælpe dig med at nedtrappe din dosis langsomt over 1 eller 2 uger. Dette skulle hjælpe med at nedsætte risikoen for gener, når du stopper med behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

#### **4. BIVIRKNINGER**

Fluoxetin Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger**

Du bør opsøge din læge straks, hvis du får disse symptomer:

- Hævelse af ansigt, tunge og/eller svælg og/eller besvær med at synke (f.eks. forårsaget af nældefeber) og/eller åndedrætsbesvær (angioødem).

- Hvis du føler dig rastløs, og det føles som om, du ikke kan sidde eller stå stille, kan det være, du har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis.  
**Hvis du oplever dette, så kontakt din læge.**
- **Informér din læge med det samme**, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får forskellige hudreaktioner eller din hud begynder at få blærer eller skaller. Dette er meget sjældent.

Nogle patienter har haft:

- En kombination af symptomer (kaldet "serotonin-syndrom") inklusive uforklarlig feber med hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt uro eller søvnighed (kun sjældent).
- Følelse af svaghed, døsighed eller forvirring; oftest set hos ældre personer og hos (ældre) personer, der tager vanddrivende medicin.
- Vedvarende og smertefuld rejsning af penis.
- Irritabilitet og udtalt uro

**Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge.**

Fortæl din læge eller apotek, hvis du oplever en af følgende bivirkninger, der bliver ved og er generende:

**Generelt** – Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. kløe, udslæt, nældefeber herunder hævelse af hud og slimhinder, betændelse af blodkar, feber og smerter i leddene, kulderystelser, overfølsomhed over for sollys, meget sjældne tilfælde af Lyell's syndrom (alvorlig tilstand med infektioner i huden).

**Fordøjelsessystem** – diarre og mavegener, opkastning, fordøjelsesbesvær, synkebesvær eller smagsforvrængning og mundtørhed. Unormal leverfunktion er rapporteret sjældent, med meget sjældne tilfælde af leverbetændelse.

**Nervesystemet** – hovedpine, søvnproblemer eller usædvanlige drømme, svimmelhed, nedsat appetit, træthed, unormal opstemthed, ukontrollerede bevægelser, krampeanfald, svær rastløshed, hallucinationer, uhæmmet adfærd, forvirring, uro, angst, nervøsitet, manglende evne til at koncentrere sig eller tænke klart, panikanfald, eller tanker om selvmord eller om at gøre skade på sig selv.

**Urinveje/kønsganer** – vandladningsbesvær eller hyppig vandladning, seksuelle forstyrrelser (forsinket eller ingen sædudtømming, ingen orgasme), vedvarende smertefuld erektion (rejsning af penis), unormal stærk udskillelse af brystmælk.

**Luftvejene** – halsbetændelse, åndenød. Der er set sjældne tilfælde af lungeproblemer (herunder betændelsestilstande af forskellige årsager og/eller fibrose (dannelse af arvæv)).

**Knoglebrud** – fra studier, foretaget hovedsagligt med patienter på 50 år og derover, vises en forøget risiko for knoglebrud hos patienter, som behandles med denne type medicin.

**Diverse** – hårtab, gaben, halsbetændelse og åndedrætsbesvær, uforklarlige blå mærker, udvidelse af kar eller blødningstendenser (f.eks. gynækologiske, hudceller, slimhindeblødninger), svedtendens, hedeture, synsforstyrrelser (sløret syn og udvidede pupiller), svimmelhed når man rejser sig op, led- og muskelsmerter og unormalt lavt indhold af natrium i blodet. De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med fluoxetin eller kort efter behandlingsophør.

Patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de behandles med denne type lægemidler. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Fluoxetin Alternova. Se også afsnittet ”Vær ekstra forsigtig med at tage Fluoxetin Alternova”.

**Yderligere for børn og unge (8-18 år)** – Fluoxetin Alternova kan hæmme væksten og muligvis kønsmodningen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

### **Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fluoxetin Alternova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Fluoxetin Alternova indeholder:**

- Aktivt stof: 20 mg fluoxetin som fluoxetinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer:

- MikrokrySTALLinsk cellulose
- Croscarmellosenatrium
- Silica kolloid vandfri
- Magnesiumstearat

### **Udseende og pakningsstørrelser**

#### *Udseende*

Fluoxetin Alternova opløselige tabletter er hvide, runde og bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side.

#### *Pakningsstørrelser*

Blisterpakning – PVC/PE/PVDC Alu:  
10, 14, 28, 30, 98 og 100 tabletter.

### **Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller**

#### *Indehaver af markedsføringstilladelse*

Alternova A/S  
Lodshusvej 11  
4230 Skælskør

#### *Fremstiller*

Viminco A/S  
Lodshusvej 11  
4230 Skælskør

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11.06.2013**