

Loratadin Alternova 10 mg tabletter

0172430901AD

Læs denne information godt igennem før De begynder at tage medicinen

- De kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem informationen. De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information som De skal læse før De tager Loratadin Alternova.
3. Sådan skal De tage Loratadin Alternova.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

Loratadin Alternova indeholder:

- Loratadin Alternova, tabletter, 10 mg.
- Det virksomme indholdsstof i Loratadin Alternova er loratadin.
- De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon og magnesiumstearat.

Markedsføring i Danmark :

Alternova A/S, Lodshusvej 11, DK-4230
Skælskør

Fremstiller:

Toll Manufacturing Services, S.L.,
C/ Aragoneses, 2, 28108 Madrid, Spanien

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Loratadin Alternova hæmmer histamins virkning. Histamin medvirker ved udviklingen af allergiske reaktioner.

Medicinen anvendes mod overfølsomhedsreaktioner (allergi), især nældefeber og høfeber samt helårssnue (allergisk rinit).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE FØR DE TAGER LORATADIN ALTERNOVA

Tag ikke Loratadin Alternova hvis:

- De er overfølsom overfor et eller flere af ind-

holdsstofferne i tabletterne.

Særlige forholdsregler:

Forsigtighed tilrådes ved anvendelse af Loratadin Alternova:

- til personer med svær nedsat leverfunktion
- ved samtidig indtagelse af alkohol.

Brug af Loratadin Alternova sammen med mad og drikkevarer

De kan tage Loratadin Alternova sammen med mad og drikkevarer.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin Alternova

Loratadin Alternova indeholder lactose. Hvis Deres læge har oplyst, at De er overfølsom overfor lactose, bør De kontakte lægen, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Erfaringer med Loratadin Alternova er begrænsede. Derfor bør det så vidt muligt ikke anvendes. Spørg lægen.

Amning:

Hvis De ammer, må De ikke tage Loratadin Alternova, da Loratadin Alternova bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Loratadin Alternova kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Loratadin Alternova bør gives med forsigtighed ved samtidig indtagelse af visse lægemidler, der nedsætter leverens omsætning. Ved hudprøvetest, som udføres for at klarlægge kilden til allergi, bør behandlingen med Lora-

tadin Alternova stoppes 48 timer før testen udføres, for at resultaterne af testen ikke påvirkes.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE LORATADIN ALTERNOVA

Dosering

Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) daglig.

Børn (2-12 år) med legemsvægt over 30 kg: 1 tablet (10 mg) daglig.

De må kun bruge Loratadin Alternova til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: Det er her nødvendigt at justere/nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for.

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De taget for mange Loratadin Alternova?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Loratadin Alternova end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er sygelig søvnighed, hurtig puls og hovedpine.

Har De glemt at tage Loratadin Alternova?

De skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for en evt. glemt dosis.

4. BIVIRNINGER

Loratadin Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
Unormal søvnighed og nervøsitet.
Hovedpine, nervøsitet og træthed er set hos børn mellem 2 år og 12 år .

Usædvanlige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Hovedpine, øget appetit, søvnløshed.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
Akut allergisk reaktion, svimmelhed, hjertebanken, kvalme, mundtørhed, mavekatar, unormal leverfunktion, udslæt, hårtab, træthed,

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker de information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Loratadin Alternova utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Loratadin Alternova efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret juli 2008