

Metaoxedrin Ophtha

Øjendråber, opløsning 2,5%

Phenylephrinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
- Lægen har ordineret Metaoxedrin Ophtha til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Øversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metaoxedrin Ophtha
3. Sådan skal du bruge Metaoxedrin Ophtha
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metaoxedrin Ophtha er et middel til at udvide øjets pupiller.

- Du skal bruge Metaoxedrin Ophtha
- i forbindelse med øjenundersøgelser
 - eller til behandling af grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

Lægen kan have givet dig Metaoxedrin Ophtha for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metaoxedrin Ophtha

Brug ikke Metaoxedrin Ophtha hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for phenylephrinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- lider af grøn stær med snæver kammervinkel.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Metaoxedrin Ophtha

Tal med lægen inden du bruger Metaoxedrin Ophtha, hvis du

- lider af en hjertekarsygdom
- lider af for højt blodtryk
- har sukkersyge (diabetes), der ikke er godt reguleret
- har en sygdom i skjoldbruskkirtlen med ændring i stofskiftet
- har betændelse i øjet
- er ældre.

Vær opmærksom på følgende

- Phenylephrinhydrochlorid står på dopinglisten og brugen kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- Tal med lægen, hvis du tager medicin mod
- depression (MAO-hæmmere)
 - eller hvis du bruger øjenmedicin, der nedsætter evnen til at se skarpt (cycloplegika f.eks. atropin).

Hvis du skal bruge yderligere øjenpræparater, skal du vente mindst 5 minutter, før du bruger det næste præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Metaoxedrin Ophtha efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Metaoxedrin Ophtha, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metaoxedrin Ophtha kan give bivirkninger som sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metaoxedrin Ophtha

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. Sådan skal du bruge Metaoxedrin Ophtha

Brug altid Metaoxedrin Ophtha nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 dråbe i hvert øje 3 gange dagligt.

PIL 116-D

Børn

Børn under 1 år skal normalt ikke have Metaoxedrin Ophtha

Brugervejledning

- Bryd flaskens forsegling ved at trække i plasticstykket nederst på flaskens hætte.
- Træk ned i nederste øjenlåg og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.



- Blink nogle gange for at fordele øjendråberne på øjet.
- Undgå at beholderens spids rører hud eller øjne.
- Sæt hættten på straks efter brug.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud, inden du drypper øjnene og vente mindst 15 minutter, før du sætter dem i igen.

Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.

Hvis du har brugt for meget Metaoxedrin Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Metaoxedrin Ophtha, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du (af den grund) føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er hurtig puls, højt blodtryk evt. med langsom puls, ekstra hjerteslag, ophidselse, uro, rastløshed, søvnløshed, rysten, hallucinationer, evt. kramper, bevidstløshed og vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har glemt at bruge Metaoxedrin Ophtha

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at dryppe øjnene. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Metaoxedrin Ophtha

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Metaoxedrin Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

- Svie ved drypning, sløret syn, lysfølsomhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Hjertebanken.
- Overfølsomhed.
- Røde øjne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Metaoxedrin Ophtha utilgængeligt for børn.

Du skal bruge Metaoxedrin Ophtha senest 1 måned efter åbning.

Brug ikke Metaoxedrin Ophtha efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger
Metaoxedrin Ophtha 25 mg/ml øjendråber indeholder

Aktivt stof: Phenylephrinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, natriumchlorid og steril, metalfrit vand.

Udseende og pakningsstørrelse
Udseende

Metaoxedrin Ophtha er en klar farveløs væske.

Pakningsstørrelse

Metaoxedrin Ophtha øjendråber 2,5 % fås i en 5 ml flaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Ophtha A/S - en del af Actavis Gruppen, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i september 2008



t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk

MOCK UP ONLY

Metaoxedrin Ophtha Øjendrøåber 2,5% DK

item no: PIL 116-D

print proof no: 02

origination date: 12.01.09

originated by: lw

revision date: 280109

revised by: lw

dimensions: 105x155

pharmacode: ?????

design repeat (single):

web:

foil pharmacode repeat:

Supplier:

colours/plates

1. black

2.

3.

4.

5.

6.

Non Printing Colours

1. Profile

2. Varnish Free

3.