



Indlægsseddel: Information til brugeren

Moclobemid Actavis

150 mg og 300 mg filmovertukne tabletter

Moclobemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Moclobemid Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give Moclobemid Actavis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Moclobemid Actavis’ virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moclobemid Actavis
3. Sådan skal du tage Moclobemid Actavis
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Moclobemid Actavis
6. Yderligere oplysninger

1. Moclobemid Actavis’ virkning og hvad du skal bruge det til

Moclobemid Actavis indeholder moclobemid og anvendes til behandling af depression.

Den biologiske mekanisme for depression er ikke fuldt klarlagt. Man ved dog, at mængden af neurotransmittere (signalstof, som overfører impulser mellem nervecellerne i hjernen) er nedsat ved visse typer af depressioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Moclobemid Actavis
Tag ikke Moclobemid Actavis:

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for moclobemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Moclobemid Actavis
- ved akut forvirring
- hvis du lider af fæochromocytom (en sædvanligvis ufarlig svulst, som afgiver hormon og øger blodtrykket)
- hvis du er i behandling med selegilin (medicin mod Parkinsons sygdom)
- hvis du er i behandling med anden medicin mod depression (fx clomipramin, fluoxetin eller fluvoxamin)
- hvis du samtidig anvender dextromethorphan (hostestillende medicin)
- hvis du er i behandling med pethidin eller tramadol (smertestillende medicin) eller triptaner (medicin mod migræne)
- hvis du er under 18 år.

Vær ekstra forsigtig med at tage Moclobemid Actavis:

- hvis du lider af en særlig form for depression med ophidselse og uro som væsentligste symptomer
- hvis du lider af skizofreni eller skizofrenilignende tilstande
- hvis du har forhøjet blodtryk
- hvis du lider af thyreotoksikose (forstyrrelse i skjoldbruskkirtelfunktionen fx Basedows eller Graves sygdom).

Hvis du skal opereres, skal narkoselægen informeres om, at du er i behandling med Moclobemid Actavis.

For mange midler mod depression kan der gå nogle uger, før der opnås en bedring. Risikoen for selvmordsforsøg er forbundet med depression, og denne risiko kan vedblive, indtil betydelig bedring indtræder. Din læge vil derfor følge dig nøje.

Det er vigtigt, at du ikke stopper med behandlingen, men kontakter din læge, hvis du føler, at det ikke går fremad som forventet.

L1835-33

Du bør undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Moclobemid Actavis.

Selv mordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende** om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler.

Følgende medicin må ikke tages samtidig med Moclobemid Actavis:

- Selegilin (medicin mod Parkinsons sygdom)
- Anden medicin mod depression såsom clomipramin, fluoxetin eller fluvoxamin.
- Dextromethorphan (hostestillende medicin)
- Pethidin og tramadol (smertestillende medicin)
- Triptaner (medicin mod migræne)

Følgende medicin skal tages med forsigtighed sammen med Moclobemid Actavis:

- Morfin, fentanyl og kodein (smertestillende medicin)
- Cimetidin (medicin mod for meget mavesyre / mavesår)
- Adrenalin og noradrenalin (medicin mod astma og lavt blodtryk)
- Efedrin, pseudoefedrin og phenylpropanolamin (findes i mange typer medicin mod hoste)
- Buspiron (beroligende medicin).

Tal med din læge. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Brug af Moclobemid Actavis sammen med mad og drikke

Du bør tage Moclobemid Actavis umiddelbart efter et måltid med et glas vand.

Tabletterne må ikke tages sammen med alkohol.

Du bør undgå samtidig indtagelse af større mængder tyraminholdig føde (fx lagret ost over 100 g pr. måltid og rødvin).

Graviditet og amning

Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Erfaringer med brug af Moclobemid Actavis under graviditet savnes. Du må derfor kun tage Moclobemid Actavis efter lægens anvisning.



Moclobemid film-coated tablet 150/300mg DK

t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk
isdn 0044 1271 327411

approved for print/date

item no: L1835-33

print proof no: 2

origination date: 09.07.08

originated by: dje

revision date: 10.10.08

revised by: dje

dimensions: 200x280

pharmacode:

design repeat (single):

web:

Supplier: Paramedical

colours/plates:

Black

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Moclobemid Actavis, da Moclobemid Actavis bliver udskilt i modermælk. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Moclobemid Actavis påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør dog undlade at køre bil eller betjene maskiner, indtil du ved, hvordan du reagerer på medicinen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Moclobemid Actavis

Moclobemid Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Moclobemid Actavis

Tag altid Moclobemid Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

300 mg daglig fordelt på 2-3 daglige doser efter måltiderne. Ved behov kan dosis gradvist øges til 600 mg.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn

Moclobemid Actavis bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Du bør tage Moclobemid Actavis efter et måltid med et glas vand.

Det er vigtigt, at du ikke stopper behandlingen eller ændrer dosis uden lægens anvisning. Hvis du synes, at virkningen af Moclobemid Actavis er for svag eller for stærk, skal du kontakte din læge.

Har du taget for mange Moclobemid Actavis tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moclobemid Actavis, end der står her i indlægssedlen, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er: Rastløshed, aggressivitet og ændret adfærd.

Hvis du har glemt at tage Moclobemid Actavis

Hvis du har glemt at tage Moclobemid Actavis, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbelt dosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Moclobemid Actavis

Du må ikke pludseligt stoppe behandlingen med Moclobemid Actavis. Hvis du ønsker at holde op med at tage Moclobemid Actavis, skal du rådføre dig med lægen, da Moclobemid Actavis skal nedtrappes gradvist over uger til måneder. Det er vigtigt, at lægen følger dig nøje i den periode.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Moclobemid Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger forekommer hovedsageligt under behandlingens første uger og aftager herefter.

Alvorlige bivirkninger

Der er ingen alvorlige bivirkninger ved brug af Moclobemid Actavis.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede): Søvnforstyrrelser, svimmelhed, kvalme, hovedpine og mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

Hudreaktioner inklusive udslæt, kløe, nældefeber og rødmen. Følelse af angst, ophidselse eller irritabilitet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Gener i mave- tarmsystemet (fx diarré, forstoppelse eller opkastning), synsforstyrrelser, rastløshed, ”myrekryb”, væskeophobninger og mælkelignende udfåd fra brystet.

Forvirring kan forekomme men forsvinder hurtigt efter ophør med behandlingen.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med moclobemid eller kort efter behandlingsophør.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Så kan bivirkningerne blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Sådan opbevarer du Moclobemid Actavis

- Opbevares utilgængeligt for børn.
 - Brug ikke Moclobemid Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Moclobemid Actavis 150 mg og 300 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er moclobemid. De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat, pregelatiniseret majsstivelse, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogolstearat, mikrokrystallinsk cellulose, propylenglycol og farvestoffet titandioxid (E171).

Tabletter 150 mg indeholder desuden farvestoffet jernoxid (E172).

Moclobemid Actavis’ udseende og pakningsstørrelser

Udseende

150 mg: Gul, rund, bikonveks, filmoverttrukket tablet med delekærv på den ene side.
300 mg: Hvid eller gullig, aflang, bikonveks, filmoverttrukket tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

150 mg: 30 og 100 tabletter
300 mg: 30 og 60 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Denne indlægsseddel blev senest revideret i august 2008





creating value in pharmaceuticals

t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk
isdn 0044 1271 327411

approved for print/date

Moclobemid film-coated tablet 150/300mg DK

item no:	L1835-33	dimensions:	200x280	colours/plates:
print proof no:	2	pharmacode:		Black 
origination date:	09.07.08	design repeat (single):		
originated by:	dje	web:		
revision date:	10.10.08	Supplier:	Paramedical	
revised by:	dje			