

Nizatidin Actavis

150 mg og 300 mg hårde kapsler

nizatidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Nizatidin Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give Nizatidin Actavis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Nizatidin Actavis' virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nizatidin Actavis
3. Sådan skal du tage Nizatidin Actavis
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Nizatidin Actavis
6. Yderligere oplysninger

Nizatidin Actavis' virkning og hvad du skal bruge det til

Nizatidin Actavis virker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre. Du kan tage Nizatidin Actavis mod mavesår, sår på tolvfingertarmen og mod sure opstød og halsbrand forårsaget af tilbageløb af mavesyre i spiserøret.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Det skal du vide, før du begynder at tage Nizatidin Actavis

Tag ikke Nizatidin Actavis, hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for det virksomme indholdsstof nizatidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nizatidin Actavis
- du tidligere har haft allergi/overfølsomhed over for anden medicin, der nedsætter dannelsen af mavesyre, da du sandsynligvis heller ikke tåler Nizatidin Actavis. Tal med din læge.

Vær ekstra forsigtig med at tage Nizatidin Actavis, hvis:

- du er ældre
- du har nedsat nyrefunktion
- du har nedsat leverfunktion.

Du må kun tage Nizatidin Actavis mod mavesår efter aftale med din

L4139-30
05604001

læge. Tal med din læge, hvis du taber dig i vægt, kaster op eller har synkebesvær.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan tage Nizatidin Actavis samtidig med anden medicin. Der er dog enkelte undtagelser. Tal med din læge.

Du kan tage Nizatidin Actavis og syreneutraliserende medicin samtidig.

Brug af Nizatidin Actavis sammen med mad og drikke

Du kan tage Nizatidin Actavis med et glas vand uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Nizatidin Actavis, hvis du er gravid. Tal eventuelt med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Nizatidin Actavis. Spørg din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nizatidin Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Nizatidin Actavis

Nizatidin Actavis 150 mg indeholder Azo-farvestoffet Sunset Yellow FCF (E110). Dette kan medføre allergiske reaktioner.

Sådan skal du tage Nizatidin Actavis

Tag altid Nizatidin Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Behandling af mavesår og sår på tolvfingertarmen

2 kapsler a 150 mg (i alt 300 mg) eller 1 kapsel a 300 mg ved sengetid eller 1 kapsel a 150 mg morgen og aften i 4-8 uger.

Behandling af sure opstød og halsbrand forårsaget af tilbageløb af mavesyre i spiserøret

1 eller 2 kapsler a 150 mg, evt. 1 kapsel a 300 mg morgen og aften.

Forebyggende langtidsbehandling

1 kapsel a 150 mg ved sengetid.

Ældre

Du skal have en mindre dosis. Følg lægens anvisning.

Børn

Du bør ikke bruge Nizatidin Actavis til børn under 15 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Du skal have en mindre dosis. Følg lægens anvisning.

Du kan tage Nizatidin Actavis uafhængigt af måltiderne.

Du skal synke kapslen hel med et glas vand. Hvis du har synkebesvær, kan du tømme kapslens indhold i et glas juice, som du skal drikke lige efter.

Hvis du har taget for mange Nizatidin Actavis kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nizatidin Actavis, end der står her i indlægseddelen, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Nizatidin Actavis

Hvis du har glemt at tage Nizatidin Actavis, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Bivirkninger

Nizatidin Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller svælg. Synke- og vejtrækningsbesvær. Blodmangel (træthed, svimmelhed), tendens til blødninger fra hud og slimhinder. Gulsot. Alvorligt hududslæt med betændelse. Søg omgående læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine og svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

Kløe, udslæt og nældefeber samt svedudbrud.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

L4139-30

05604001

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Så kan bivirkningerne blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Sådan opbevarer du Nizatidin Actavis

Opbevar Nizatidin Actavis utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Nizatidin Actavis over 30°C.

Brug ikke Nizatidin Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

Yderligere oplysninger

Nizatidin Actavis 150 mg og 300 mg hårde kapsler indeholder

Det virksomme indholdsstof er nizatidin.

De øvrige indholdsstoffer er:

Nizatidin Actavis 150 mg: Croscarmellosematrik, povidon K-30, majsstivelse, dimeticon 100cS, talcum, gelatine, chinolingult (E104), titandioxid (E171), Sunset Yellow FCF (E110) og gul jernoxid (E172). Nizatidin Actavis 300 mg: Croscarmellosematrik, povidon K-30, majsstivelse, dimeticon 100cS, talcum, gelatine, chinolingult (E104), erythrosin (E127), titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Nizatidin Actavis' udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Nizatidin Actavis 150 mg er tofarvede kapsler (gul/lys gul) mærket "B/14" med sort tryk indeholdende rødhvidt til gulligt granulat.

Nizatidin Actavis 300 mg er tofarvede kapsler (lys orange/lys gul) mærket "B/15" med sort tryk indeholdende rødhvidt til gulligt granulat.

Pakningsstørrelser

14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Niche Generics Limited, 1 Cam centre Wilbury way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TW, England.

Denne indlægseddelen blev senest revideret i oktober 2007



Nizatidin capsule hard 150/300mg DK

t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.co.uk
isdn 0044 1271 327411

approved for print/date

item no:	L4139-30
print proof no:	2
origination date:	20.02.08
originated by	DJE
revision date:	07.03.08
revised by:	dje

dimensions:	170x180
pharmacode:	256
design repeat (single):	
web:	

colours/plates:	
Black	