

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pilokarpin Ophtha 2 % og 4 % øjendråber, opløsning

Pilocarpinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Pilokarpin Ophtha til dig personligt. Lad derfor være med at give Pilokarpin Ophtha til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pilokarpin Ophtha
3. Sådan skal du bruge Pilokarpin Ophtha
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pilokarpin Ophtha er et middel til at mindske trykket i øjet.

Det virker ved at få øjets pupil til at trække sig sammen og ved at forbedre passagen af væsken i øjet.

Du skal bruge Pilokarpin Ophtha til behandling af grøn stær (glaukom).

Lægen kan have givet dig Pilokarpin Ophtha for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PILOKARPIN OPHTHA

Brug ikke Pilokarpin Ophtha

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for pilocarpinhydrochlorid eller et af de andre indholdsstoffer.
- hvis du lider af akut betændelse i øjets regnbuehinde.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Pilokarpin Ophtha

Tal med lægen, inden du bruger Pilokarpin Ophtha, hvis

- dit øje er hævet, rødt eller irriteret. Det kan være tegn på betændelse
- du har dårligt hjerte
- du har astma
- du har mavesår
- du lider af for højt blodtryk
- du har problemer med vandladningen
- du har Parkinsons sygdom
- du har for højt stofskifte
- du har sår på hornhinden.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen, du bruger Pilokarpin Ophtha, hvis du skal have dryppet øjnene med atropin.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Pilokarpin Ophtha og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Pilokarpin Ophtha efter aftale med lægen.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Pilokarpin Ophtha.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pilokarpin Ophtha kan give bivirkninger (nedsat nattesyn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vær opmærksom på, at der kan opstå forbigående sløret syn efter drypning af øjet.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pilokarpin Ophtha

Indholdet af benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Pilokarpin Ophtha, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PILOKARPIN OPHTHA

Brug altid Pilokarpin Ophtha nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Grøn stær

Pilokarpin 2 % eller 4 %

Du skal dryppe hvert øje 4-6 gange dagligt.

Akut grøn stær

Pilokarpin 4 %

Du skal dryppe hvert øje hyppigt i nøje samråd med lægen.

Brugervejledning

- Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget hårdt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.
- Denne flasketype er lettest at bruge, hvis du presser let på flaskens bund med pegefingern, når øjet skal dryppes.
- Drypning udføres ved at trække ned i nederste øjenlåg, hvorefter 1 dråbe dryppes ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.



- Undgå, at beholderens spids kommer i berøring med hud eller øjne.

Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.

Hvis du har brugt for meget Pilokarpin Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Pilokarpin Ophtha, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Pilokarpin Ophtha.

En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge Pilokarpin Ophtha

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene, så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Pilokarpin Ophtha

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Pilokarpin Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede.

- Lysglimt eller pludselig øget mængde af uklarheder eller skygge i synsfeltet pga. nethindeløsning. Kontakt straks læge eller skadestue.
- Astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Irritation i øjet.
- Nedsat evne til at se skarpt.
- Nedsat nattesyn.
- Hovedpine.
- Tågesyn.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

- Øget tåreflåd.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede.

- Allergiske reaktioner. Kan være eller blive alvorlige. Tal med lægen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Svimmelhed pga. forbigående fald i blodtrykket.
- Langsom puls.
- Kramper i maven, øget svedsekretion.
- Kraftsløshed og svaghed.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

- Kvalme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Brændende fornemmelse, svie, kløe, sløret syn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Pilokarpin Ophtha utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Pilokarpin Ophtha ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Pilokarpin Ophtha mere end 1 måned efter åbning.
- Brug ikke Pilokarpin Ophtha efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pilokarpin Ophtha øjendråber 2 % og 4 % indeholder

Aktivt stof: Pilocarpinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Øjendråber 2 %: Borsyre, natriumcitrat, natriumchlorid, benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat dihydrat og sterilt vand.

Øjendråber 4 %: Borsyre, natriumcitrat, benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat dihydrat og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pilokarpin Ophtha er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser

Pilokarpin Ophtha øjendråber 2 % og 4 % fås i en 10 ml plastflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ophtha A/S - en del af Actavis Gruppen, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Denne indlægsseddel blev senest revideret i oktober 2013