

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cincain Ophtha

Øjensalve 0,5 %

Cinchochain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
- Lægen har ordineret Cincain Ophtha til dig personligt. Lad derfor være med at give Cincain Ophtha til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cincain Ophtha
3. Sådan skal du bruge Cincain Ophtha
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Cincain Ophtha er en lokalbedøvende øjensalve.

Du skal bruge den mod smerter ved svejseøjne.

Lægen kan have givet dig Cincain Ophtha for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Cincain Ophtha

Brug ikke Cincain Ophtha, hvis du

- er overfølsom over for cinchocain eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Cincain Ophtha

Vær opmærksom på følgende

- Du må ikke bruge Cincain Ophtha sammen med kontaktlinser.

- Den lokalbedøvende virkning af Cincaïn Ophtha kan dække over smerter, som er forårsaget af fremmedlegemer, øjenbetændelse eller skade i øjet.
- Hvis smerten ikke er forsvundet næste morgen, skal du kontakte øjenlæge eller skadestuen.

Du skal beskytte det bedøvede øje mod støv og andre fremmedlegemer. Hold øjet tildækket.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Cincaïn Ophtha under graviditet.

Amning

Du kan bruge Cincaïn Ophtha selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cincaïn Ophtha kan give sløret syn, lige efter du har brugt salven. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Cincaïn Ophtha

Brug altid Cincaïn Ophtha nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

En streg af øjensalven lægges i det nederste øjenlåg.

Ved fortsatte smerter kan du gentage behandlingen 1-2 gange inden for det første døgn. Fortsætter smerterne herefter, skal du kontakte øjenlæge eller skadestue.

Brugervejledning

- Vask hænderne grundigt, inden du lægger øjensalven i øjet.
- Træk forsigtigt det nederste øjenlåg ud og tryk en streg af øjensalven ind i øjenlågsfolden.



Vær opmærksom på, at tuben kun indeholder 1 gram salve og derfor kan virke tom. Der kan forekomme luftlommer.

Hvis du har brugt for meget Cincaïn Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere salve end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

4. Bivirkninger

Cincaïn Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Cincaïn Ophtha kan dække over smerter, som er forårsaget af fremmedlegemer, øjenbetændelse eller skade i øjet. Hvis smerten ikke er forsvundet næste morgen, skal du kontakte øjenlæge eller skadestuen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Cincaïn Ophtha utilgængeligt for børn.
- Brug senest Cincaïn Ophtha 1 måned efter åbning.
- Du kan opbevare Cincaïn Ophtha ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Cincaïn Ophtha efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Cincain Ophtha øjensalve 0,5 % indeholder

Aktivt stof: Cinchocain.

Øvrige indholdsstoffer: Paraffinolie og gul, blød paraffin.

Udseende af Cincain Ophtha og pakningsstørrelser**Udseende**

Cincain Ophtha er en gul salve.

Pakningsstørrelse

Cincain Ophtha fås i en 1 g tube.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ophtha A/S - en del af Actavis Gruppen, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A, Viacostarica 20/22, 00040 Pomezia, Rom, Italien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2013