

INDLÆGSSEDDEL

Den senest opdaterede tekst til indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. Veterinærlægemidlets navn

Panacur Vet., 18,75 %, oral pasta

2. Sammensætning

Hvert g pasta indeholder:

Aktivt stof:

Fenbendazol 187,5 mg/g

Hjælpestoffer:

Methylparahydroxybenzoat (E 218) 1,7 mg
Propylparahydroxybenzoat (E 216) 0,16 mg

3. Dyrearter

Til hest.

4. Indikationer

Parasitangreb med rundorm i mave-tarm-kanalen hos heste.

5. Kontraindikationer

Ingen kendte.

6. Særlige advarsler

Særlige advarsler:

Der bør udvises forsigtighed for at undgå følgende praksis vedrørende brugen, da det øger risikoen for udvikling af modstandsdygtighed (resistens) og i sidste ende kan resultere i ineffektiv behandling:

- For hyppig og gentagen brug af præparater mod ormeinfektion (anthelmintika) fra samme klasse over en længere periode.
- Underdosering, som kan ske på grund af undervurderet kropsvægt, forkert administration af lægemidlet eller forkert indstilling af doseringsprøjetten.

Formodede tilfælde af modstandsdygtighed over for præparater mod ormeinfektion bør undersøges yderligere ved hjælp af passende tests. Hvis testresultatet viser modstandsdygtighed over for et bestemt præparat, bør der anvendes et ormepræparat af en anden type med en anden virkningsmekanisme.

Modstandsdygtighed over for fenbendazol er blevet rapporteret ved cyathostomer hos heste. Derfor bør anvendelse af dette lægemiddel baseres på lokal information (regionalt eller på besætningsniveau) om forekomsten og fordelingen af sygdommen og effekten over for rundorme. Anvendelsen skal desuden baseres på anbefalinger om, hvordan modstandsdygtighed over for præparater mod ormeinfektion begrænses.

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:

Beregn kropsvægten så præcist som muligt før beregning af dosis.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Undgå så vidt muligt direkte kontakt med huden. Vask hænder efter brug.

I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles med vand.

Særlige forholdsregler vedrørende beskyttelse af miljøet:

Fenbendazol er giftigt for fisk og andre vandlevende organismer.

Drægtighed og laktation:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

7. Bivirkninger

Hest:

Ingen kendte.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse eller den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Gives i munden.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt.

Den anbefalede dosis er 7,5 mg fenbendazol pr. kg, kropsvægt, svarende til:

Samlet vægt:	Panacur Vet. oral pasta:
150 kg	1/4 sprøjte
300 kg	1/2 sprøjte
600 kg	1 sprøjte

I tilfælde af parasitær føldiarré forårsaget af parasitten *Strongyloides westeri* er den anbefalede dosis 50 mg fenbendazol pr. kg kropsvægt, svarende til:

Samlet vægt:	Panacur Vet. oral pasta:
90 kg	1 sprøjte


Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. Oplysninger om korrekt administration

Brugsanvisning til doseringssprøjte:

1. På stemplet er anført vægtinddeling fra 0 til 600 kg kropsvægt. Stilleskruen indstilles således, at kg-angivelsen er synlig foran stilleskruens forreste kant.
2. Beskyttelsehætten fjernes.
3. Tubens spids indføres i hestens mundvig og stemplet trykkes i bund, så langt stilleskruen tillader, hvormed den nødvendige mængde oral pasta er indgivet.

Eks.: Billedet viser sprøjten indstillet til en hest på 300 kg.



10. Tilbageholdelsestider

Slagtning: 30 dage.

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter forkortelsen Exp.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Dette veterinærlægemiddel må ikke udledes i vandløb, da fenbendazol kan være farligt for fisk og andre vandorganismer.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

13. Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

Doseringssprøjte med 24 g.

MTnr: 10595

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen

03/09/2024

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
Frankrig

Lokal repræsentant og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:

MSD Animal Health A/S
Havneholmen 25
1561 København V
Tlf.: 44 82 42 00