

Persantin® Retard 200 mg, hårde depotkapsler

Dipyridamol

L80006A-03

Persantin® Retard er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Persantin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin Retard
3. Sådan skal du tage Persantin Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Persantin Retard hører til gruppen af blodfortyndende medicin. Persantin Retard nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Du kan tage Persantin Retard til forebyggelse af blodpropper, hvis du har haft en blodprop i hjernen eller forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser (transitorisk cerebral iskæmi, TCI). Du kan tage det sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

Lægen kan have givet dig Persantin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERSANTIN RETARD

Tag ikke Persantin Retard

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Persantin Retard

Tal med lægen inden behandling med Persantin Retard, hvis du har:

- Alvorlig hjerte- eller karsygdom.
- En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Tendens til galdesten.

Hvis du skal have foretaget en undersøgelse af din hjertefunktion, skal du inden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin Retard. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Medicin mod muskelsygdom (myasthenia gravis).
- Medicin mod forhøjet blodtryk.
- Medicin mod uregelmæssig hjerterytme (adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- Medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xantiner).
- Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre).

Brug af Persantin Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Persantin Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin Retard, da dipyridamol går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin Retard kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERSANTIN RETARD

Tag altid Persantin Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 depotkapsel 2 gange daglig (1 kapsel om morgenen og aftenen).

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand.

Ved utålelig hovedpine

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Persantin Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. Der kan forsøgsvis doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da hovedpinen normalt forsvinder ved forsat dosering, skal du hurtigst muligt skifte til normal dosering, sædvanligvis indenfor en uge.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn bør ikke få Persantin Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Persantin Retard kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin Retard kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, blødningstendens og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Persantin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Persantin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Persantin Retard. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Persantin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 1.000 patienter.

- Åndenød, angst, bryst smerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklens eller blodprop i hjertet. Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Øget blødning under eller efter operation. Kontakt lægen eller skadestue.
- Åndenød pga. overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbensbuen på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Opkastning.
- Muskelsmerter.
- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Hædture.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Persantin Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Persantin Retard ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Persantin Retard efter den udløbsdato, der står på kartonen eller etiketten. Udløbsdato (EXP:) er sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Persantin Retard 200 mg, hårde depotkapsler indeholder:

- Aktivt stof: Dipyridamol
- Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, methacrylsyre-methacrylat copolymer (1:2), talkum, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, triacetin, dimeticon 350 og stearinsyre.
- Kapselskallerne indeholder: Gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172)

Pakningsstørrelse

Persantin Retard fås i pakninger med 60 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abacus Medicine ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com.

Ompakket og frigivet af

Abacus Medicine ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010