

RHINOCORT® AQUA

- Næsespray suspension hhv. 32 mikrogram/dose og 64 mikrogram/dose

A200708002

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Rhinocort® Aqua til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Rhinocort® Aqua
3. Sådan skal du bruge Rhinocort® Aqua
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Rhinocort® Aqua er en vandig opslæmning. Rhinocort® Aqua indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse). Du kan bruge Rhinocort® Aqua lokalt i næsen til: Forebyggelse af høfeber og helårssnue. Behandling af polypper i næsen. Forebyggelse af nye polypper i næsen efter operation. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Rhinocort® Aqua

Brug ikke Rhinocort® Aqua hvis

Du er overfølsom for det aktive stof budesonid eller for ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i næsespræyen.

Særlige forholdsregler

Fortæl din læge såfremt du har eller har haft lungetuberkulose.

Brug af Rhinocort® Aqua sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Rhinocort® Aqua sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Rhinocort® Aqua

Kaliumsorbat kan give hududslæt.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid skal du rådføre dig med din læge, inden du bruger Rhinocort® Aqua.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Rhinocort® Aqua. Det aktive stof udskilles i brystmælken. Dog forventes der ingen påvirkning af det ammede barn ved de almindelige angivne doseringer af Rhinocort® Aqua som angivet under afsnittet "Dosering".

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rhinocort® Aqua påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Rhinocort® Aqua kan bruges samtidigt med andre lægemidler i forbindelse med anden behandling.

3. Sådan skal du bruge Rhinocort® Aqua

Dosering

Forebyggelse af høfeber og helårssnue:

Du bør starte den forebyggende behandling af din høfeber inden pollensæsonen begynder.

Du får fuld virkning efter få dages brug, i sjældne tilfælde kan der dog gå op til 2 uger.

Næsespray 32 mikrogram/dosis:

Voksne:

2 pust 2 gange dagligt i hvert næsebor (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået kan dosis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor 2 gange dagligt (det svarer til 128 mikrogram om dagen i alt).

Børn over 6 år: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort® Aqua til børn under 6 år.

Næsespray 64 mikrogram/dosis:

Voksne:

2 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 256 mikrogram i alt). Når den ønskede virkning er opnået kan du nøjes med 1 pust i hvert næsebor om morgenen (det svarer til 128 mikrogram om dagen i alt).

Børn over 6 år: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort® Aqua til børn under 6 år.

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:

Næsespray 64 mikrogram/dosis:

Voksne:

Et pust i hvert næsebor morgen og aften (det svarer til 256 mikrogram i alt).

Børn over 6 år: Som for voksne. Du bør ikke bruge Rhinocort® Aqua til børn under 6 år.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Anvisninger og dosering fastlægges af lægen, da behovet for Rhinocort® Aqua er forskelligt fra patient til patient.

Brugsanvisning

Læs hele brugsanvisningen før brug.

Inden Rhinocort® Aqua næsespray anvendes første gang, skal flasken rystes, og derefter skal der pumpes 5-10 gange i luften, indtil spræyen afgiver forstøvet væske. Hvis Rhinocort® Aqua ikke anvendes dagligt, skal der først pumpes en enkelt gang i luften.

Gør derefter følgende:

1. Puds næsen - ryst flasken og fjern den brune plastikhætte.
2. Hold næsespræyen som vist på tegningen.



3. Hold hovedet i oprejst stilling. Pump én gang til hvert næsebor, medens der samtidigt lukkes for det andet næsebor med en finger. Træk vejret normalt ind gennem næsen.

4. Efter brug sættes plasthætten på flasken igen.



Børn bør instrueres grundigt i brugen af Rhinocort® Aqua.

Rengøring: Plastdelene skal rengøres med passende mellemrum. Den brune plastikhætte og den hvide næsespids tages af. Skyl eller vask begge dele i lunkent vand. Plastdelene lufttørres og påsættes igen. Opbevar flasken med medicinen stående.

Har du taget for meget Rhinocort® Aqua?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Rhinocort® Aqua, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er dog ingen risiko forbundet med at tage for meget Rhinocort® Aqua en enkelt gang.

Har du glemt at tage Rhinocort® Aqua?

Hvis du glemmer at tage én dosis, skal du ikke tage dobbeltdosis, men blot fortsætte med at tage din medicin som du plejer.

4. Bivirkninger:

Rhinocort® Aqua kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).

Hævelse i mund og svælg. Kontakt straks læge eller skadestue eller ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter).

Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Irritation i næsen i form af tørhed og nysen, umiddelbart efter brugen, samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).

Nældefeber, udslæt, kløe og betændelseslignende tilstande.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter).

Sårdannelse i næsen.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Rhinocort® Aqua utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Rhinocort® Aqua efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Abacus Medicine ApS

Vesterbrogade 149

DK-1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Ved henvendelse bør det påtrykte batchnummer oplyses.

Rhinocort® er et registreret varemærke, der tilhører AstraZeneca-koncernen.

Rhinocort® Aqua indeholder

Rhinocort® Aqua, næsespray suspension, indeholder styrken 32 eller 64 mikrogram/dosis. Det virksomme indholdsstof i Rhinocort® Aqua er budesonid. De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose. Natriumcarboxymethylcellulose. Vandfri glucose. Polysorbat 80. Dinatriummederat. Saltsyre (pH-justering). Renset vand. Kaliumsorbat 1,2 mg pr. ml.

Markedsføring i Danmark

Abacus Medicine ApS

Vesterbrogade 149

DK-1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Rhinocort® Aqua, næsespray suspension markedsføres af Abacus Medicine ApS bl.a. i flg. pakningsstørrelser:

Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dose i 120 doser.

Revideret: 08.2007