

INDLÆGSSEDEL:

Porcilis ERY VET.

INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION



1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holland

Dansk repræsentant:

MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V

Tlf: +45 44 54 69 00

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Porcilis Ery Vet., injektionsvæske, suspension

3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml indeholder:

Antigen koncentrat 100 mg

indeholdende ≥ 25 IU. *E. rhusiopathiae* antigen

Adjuvans:

dl- α -tocopherolacetat

4. INDIKATIONER

Aktiv immunisering af svin mod rødsyge.

5. KONTRAINDIKATIONER

Kun raske dyr bør vaccineres.

Vaccination af avlsaktive ormer er ikke undersøgt.

6. BIVIRKNINGER

Efter vaccination kan let, forbigående stigning af kropstemperatur samt forbigående hævelse på injektionsstedet forekomme. Allergiske reaktioner kan ses.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Svin.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESTID

Dosis pr. gris er 2 ml, som gives dybt intramuskulært bag øret. Vaccination af grise kan ske fra 12 ugers alderen.

Vaccination foretages 2 gange med 4 ugers mellemrum. Revaccination bør sker hver 5. måned.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Vaccinen skal have stuetemperatur (15-25 °C) før vaccination påbegyndes. Omrystes før og under brug.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagning: 0 døgn.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2-8°).

Efter anbrud: 10 timer ved 15-25 °C.

Må ikke fryses.

Beskyttes mod lys.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Drægtighed og diegivning:

Kan anvendes.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Ingen kendte.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Ingen særlige symptomer ved dobbelt dosis.

Uforlideligheder:

Ingen kendte.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLER

Oktober 2019

15. ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser: 50 ml og 100 ml i karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Den senest opdaterede tekst til indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk



MSD
Animal Health

