

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Andolex® 1,5 mg/ml, mundskyllevæske

benzydaminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Andolex til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Andolex
3. Sådan skal du bruge Andolex
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Andolex er en mundskyllevæske, som du kan bruge mod betændelsestilstande i mund og svælg.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du bruge, før du begynder at tage Andolex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Andolex

- hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer. Indholdsstoffet methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner, også efter du er holdt op med at bruge Andolex.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Andolex, hvis:

- du lider eller tidligere har lidt af astma
- du er allergisk over for acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler, som også virker mod betændelsestilstande (kaldet NSAID)
- du har alkoholproblemer. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Andolex uden først at tale med din læge.

Du kan fortynde Andolex mundskyllevæske med vand, hvis du får en stikkende fornemmelse i munden, når du bruger Andolex. Undgå at få Andolex i øjnene.

Brug af anden medicin sammen med Andolex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Andolex indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Andolex uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Andolex under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Andolex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Andolex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Andolex indeholder ethanol og methylparahydroxybenzoat

Andolex, mundskyllevæske indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis. Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Andolex uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet.

Andolex, mundskyllevæske indeholder også methylparahydroxybenzoat (E218) som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Andolex

Brug altid Andolex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Skyl munden eller gurgl med 15 ml hver 1½ til 3. time efter behov.

Børn over 12 år

Skyl munden eller gurgl med 5-15 ml hver 1½ til 3. time efter behov.

Hvis du bruger mere Andolex, end du bør

Hvis du tager for meget, eller du ved et uheld kommer til at sluge store mængder af din medicin, skal du omgående kontakte din læge eller spørge apotekspersonalet til råds.

4. Bivirkninger

Andolex kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Tegnene på en sådan reaktion kan være vejrtrækningsbesvær, smerter i/trykken for brystet og/eller svimmelhed/følelse af at være ved at besvime, voldsom kløe i huden eller hævede områder på huden, læberne, tungen og/eller i svælget, hvilket kan være potentielt livstruende.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Følelsesløshed og en stikkende fornemmelse i munden.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):
Kløe, nældefeber, eksem og hududslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Allergisk reaktion.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Andolex utilgængeligt for børn.

Brug ikke Andolex efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1 ml mundskyllevæske indeholder:

Aktivt stof: 1,5 mg benzydaminhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Ethanol, glycerol, polysorbat 20 og smagsstoffer: Mouthwash Flavour 52 503T, saccharinnatrium samt konserveringsmiddel: Methylparahydroxybenzoat (E218) og farve: Patent Blue V (E131) og quinolingult (E104). Renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Andolex er en grøn, klar mundskyllevæske med mintsma.

Pakningsstørrelse

300 ml glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Meda AS
Solvang 8

3450 Allerød
Tlf.: 4452 8888
e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

3M Health Care Limited
Derby Road
Loughborough
Leicestershire
LE11 5SF
Storbritannien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 08/2018.