



Information om

Ibaril®

Creme 2,5 mg/g

desoximetason.

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Ibaril til dig personligt. Lad derfor være med at give Ibaril til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse:

1. Ibaril's virkning og hvad du skal anvende det til
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Ibaril
3. Sådan skal du anvende Ibaril
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Ibaril
6. Yderligere oplysninger

1. IBARIL'S VIRKNING OG HVAD DU SKAL ANVENDE DET TIL

Ibaril indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Ibaril dæmper betændelse og allergi. Ibaril virker også udtørrende og kløestillende.

Du kan anvende Ibaril mod eksem og psoriasis. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE IBARIL

Anvend ikke Ibaril creme hvis:

- Du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Ibaril creme.

Anvend ikke Ibaril creme mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden.
- Bumser eller på områder med bumser.
- Udslæt med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Betændelse i huden med bakterier, virus eller svampe – medmindre betændelsen samtidig behandles med en anden medicin.
- Udslæt og bleudslet (rød hale), hos børn under 1 år.

Vær ekstra forsigtig med at anvende Ibaril

- Behandlingen bør ikke vare længere end højest nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør ikke anvende hormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, særligt i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Du bør især undgå at anvende binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.

- Du bør ikke anvende tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Hvis du har anvendt Ibaril i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Du bør ikke anvende Ibaril rundt om øjnene.
- Undgå at få Ibaril i øjnene.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du anvender Ibaril i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du anvender Ibaril creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ibaril creme.

Anvendelse af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du kan anvende Ibaril sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du anvender nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun anvende Ibaril creme efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan anvende Ibaril creme i korte perioder, mens du ammer. Spørg lægen. Undgå at anvende Ibaril på og omkring brystvorterne mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibaril påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.



Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Ibaril

Ibaril creme indeholder paraffin som kan få latex kondomer til at blive utætte eller sprække. Ibaril indeholder lanolin-, cetyl-, og stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE IBARIL CREME

Dosering

Voksne: Smør Ibaril creme på 1–3 gange dagligt. Vask hænder efter påsmøring, medmindre det er hænderne der behandles.

Din behandling med Ibaril creme bør ikke vare længere end 4 uger. Hvis behandlingen varer længere, skal du gå til regelmæssig kontrol hos lægen.

Børn: Du må kun anvende Ibaril til børn efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har anvendt for meget Ibaril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Ibaril, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at anvende Ibaril?

Har du glemt at anvende Ibaril creme, fortsætter du blot med at bruge næste dosis som ordineret.

4. BIVIRKNINGER

Ibaril kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis du bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Hypighed ikke kendt:

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken på grund af længerevarende forøget mængde af binyrebarkhormon i kroppen (hyperkorticisme). Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Ny betændelse i huden.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
- Små punktformede eller større blødninger i huden.
- Udslæt i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Kontakteksem.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Betændelse i hårsække.
- Uønsket behåring.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Lyse eller brune pletter på huden.

Hypighed ikke kendt:

- Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 - Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive

indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive opdateret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU IBARIL CREME

Opbevar Ibaril utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ibaril creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ibaril creme indeholder:

Det aktive indholdsstof i Ibaril creme er: Desoximetason 2,5 mg/g

De øvrige indholdsstoffer er: isopropylmyristat, lanolinalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, hvid blød paraffin, aluminiumtristearat, magnesiumstearat, rensat vand.

Pakningsstørrelser:

Ibaril Creme findes i en tube med 50 g.

Marksøføring i Danmark:

sanofi-aventis Danmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller:

Sanofi-Aventis. Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland.

Dato: januar 2007

