

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Cyklokapron, 500 mg filmovertrukne tabletter Tranexamsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Cyklokapron til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cyklokapron
3. Sådan skal du tage Cyklokapron
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Cyklokapron er et middel mod blødning pga. størkningsforstyrrelser i blodet.
- Det virker ved at hæmme de stoffer i blodet, der opløser størknet blod.
- Du kan tage Cyklokapron ved nogle former for blødning, det kan være
 - o blødning efter operation på blærehalskirtlen (prostata)
 - o blod i urinen
 - o svære næseblødninger
 - o kraftige menstruationsblødninger
 - o blødninger efter kegleoperation på livmoderen
 - o arveligt Quincke's ødem.

Lægen kan have givet dig Cyklokapron for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CYKLOKAPRON

Tag ikke Cyklokapron, hvis du

- er overfølsom overfor det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har årebetændelse eller blodprop i f.eks. lunger, ben eller hjernen
- har en blødning i hjernehalvdelene.

Vær ekstra forsigtig med at tage Cyklokapron

Tal med lægen, inden du tager Cyklokapron, hvis du

- eller en i din nærmeste familie har haft en blodprop eller har tendens til at få blodpropper eller dyb årebetændelse
- har uregelmæssig menstruation uden at kende årsagen
- har dårlige nyrer
- blod i urinen uden kendt årsag.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du tager Cyklokapron mod kraftig menstruationsblødning, skal du kontakte lægen, hvis blødningerne ikke aftager.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Cyklokapron. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og kosttilskud.

Fortæl det til lægen inden du tager Cyklokapron, hvis du tager blodfortyndende medicin.

Brug af Cyklokapron sammen med mad og drikke

Du skal tage Cyklokapron med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Cyklokapron efter aftale med lægen.

Amning

Cyklokapron går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Cyklokapron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE CYKLOKAPRON

Tag altid Cyklokapron nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Efter operation på blærehalskirtlen skal du på 4. dagen efter operationen tage 2 – 3 tabletter på 500 mg 2 – 3 gange daglig og fortsætte, til der ikke længere er blod i urinen.

Ved blod i urinen skal du tage 2 – 3 tabletter på 500 mg 2 – 3 gange daglig indtil, der ikke længere er blod i urinen.

Ved svære næseblødninger skal du tage 3 tabletter på 500 mg 3 gange daglig i 4 – 10 dage. Tal med lægen.

Ved kraftige menstruationsblødninger skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3 gange daglig så længe som nødvendigt i op til 4 dage. Ved meget kraftige menstruationsblødninger kan dosis øges. Den totale daglige dosis bør ikke overskride 4 g (8 tabletter). Du skal først begynde behandlingen, når du har kraftig blødning. Tal med lægen.

Ved kegleoperation på livmoderen skal du tage 3 tabletter 3 gange daglig i 12 – 14 dage efter operation.

Ved arveligt Quincke's ødem skal du ved anfald tage 2 – 3 tabletter på 500 mg 2 – 3 gange daglig i nogle dage.

Forebyggende skal du tage 2 tabletter på 500 mg 3 – 4 gange daglig.

Nedsat nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Cyklokapron tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cyklokapron, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: kvalme, diarré, svimmelhed og hovedpine. Svimmelhed ved ændring fra liggende/siddende til stående stilling og muskelsvaghed kan forekomme. Hos nogle kan der opstå blodpropper.

Hvis du har glemt at tage Cyklokapron

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt din læge, hvis du har glemt at tage en dosis.

Hvis du holder op med at tage Cyklokapron

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Cyklokapron kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01-0,1%).

- Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter (1-10%).

- Kvalme, opkastning, diarré (er normalt mildt og forbigående).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem end 1 og 10 ud af 1000 patienter (0,1-1%).

- Allergiske hudreaktioner. Kan være eller blive alvorlige. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter (0,01-0,1%).

- Nedsat farvesyn og andre synsforstyrrelser.
- Svimmelhed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Du kan opbevare Cyklokapron ved almindelig temperaturer.
- Opbevar Cyklokapron utilgængeligt for børn.
- Tag ikke Cyklokapron efter den udløbsdato, som står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Cyklokapron 500 mg filmovertukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Tranexamsyre.
- Øvrige indholdsstoffer: Eudragit E100, hydroxypropylcellulose (L-HPC), magnesiumstearat, mikrokrySTALLinsk cellulose, povidon, polyethylenglycol 8000, talcum, vandfri kolloid silica, vanillin.
- Farvestoffer: Titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Cyklokapron filmovertukne tabletter er hvide, aflange og svagt hvælvede.

Pakningsstørrelser

30 stk. og 60 stk. i blisterpakning samt 100 stk. i plastbeholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS,
Solvang 8,
3450 Allerød,
tlf. nr.: 44 52 88 88;
fax nr.: 44 52 88 99;
e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Meda Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1, D-51063 Köln, Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2011