

Information om Ercoril overtrukne tabletter 15 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage Ercoril

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Ercoril til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

1. Virkning og anvendelse

- Ercoril er mørkbeige til brune, runde, overtrukne tabletter.
- Ercoril virker afslappende på tarmens muskulatur.
- Du kan bruge Ercoril til behandling af smertefulde sammentrækninger (kolikker) i maven og tarmen.
- Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Ercoril

Tag ikke Ercoril hvis:

- du lider af grøn stær, besvær med at lade vandet, spiserørsbrok, forsinket tømning af mavesækken, forstoppelse eller hurtig puls.
- du er overfølsom over for det aktive stof, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler:

Tal med lægen, før du tager Ercoril, hvis du lider af blødende betændelse i tyktarmen (colitis ulcerosa), har problemer med hjertet, nervebetændelse eller har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Brug af Ercoril sammen med mad og drikkevarer:

Mad kan forsinke virkningen af Ercoril. Du bør derfor tage Ercoril 1/2-1 time før måltidet.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ercoril

Ercoril indeholder lactose og saccharose. Kontakt derfor lægen, før du tager medicinen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Ercoril indeholder ligeledes methyl-og propylparahydroxybenzoat (E218/E216), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Ercoril efter lægens anvisning.

Amning:

Du må kun tage Ercoril efter lægens anvisning. Ercoril kan nedsætte mængden af mælk.

Trafik-og arbejdssikkerhed:

Ercoril kan give bivirkninger, der i mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du bør ikke tage Ercoril samtidig med medicin mod:

- uregelmæssig hjerterytme,
- depressioner,
- transportsyge og kvalme,
- høfeber, nældefeber og kronisk snue.

Du bør ikke tage Ercoril, hvis du får medicin mod nedsat blære- eller tarmfunktion eller en speciel form for muskelsvaghed (myasthenia gravis).

Virkningen af Ercoril kan være forsinket, hvis du samtidig tager midler mod for meget mavesyre.

3. Sådan skal du tage Ercoril:

Dosering

Voksne:

1-2 tabletter 2-3 gange daglig. Du bør tage Ercoril ½-1 time før måltider.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Børn:

Du må ikke bruge Ercoril til børn. Tal med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Du bør kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen.

Har du taget for meget Ercoril?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ercoril, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Ercoril kan du få hurtig hjertebanken, besvær med vandladningen, forstoppelse, tørhed i munden eller besvær med at se skarpt.

Har du glemt at tage Ercoril?

Tag aldrig dobbelt dosis for glemte doser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

4. Bivirkninger:

Ercoril kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Meget hurtig puls. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mundtørhed, forstoppelse og nedsat evne til at svede.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Synsforstyrrelser, forstørrede pupiller. Besvær med at lade vandet.

Store doser af Ercoril kan medføre impotens og lavt blodtryk i stående stilling (besvimelse).

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Ercoril utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ercoril efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Ercoril overtrukne tabletter 15 mg indeholder:

- Det virksomme stof er propanthelinbromid.
- De øvrige indholdsstoffer er: Lactose; povidon; talcum; magnesiumstearat; saccharose; akaciegummi; celluloseacetatphthalat; ricinusolie; macrogol 6000; methylparahydroxybenzoat (E218); propylparahydroxybenzoat (E216); titandioxid (E171); jernoxid (gul, rød og sort)(E172).

Markedsføring i Danmark:

medic team a/s

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 45 82 75 30 / Fax: 45 82 22 75

E-mail: info@medicteam.dk

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Revideret marts 2006