

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Laktulose medic, 667 mg/ml, oral opløsning lactulose

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Laktulose medic uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Laktulose medic.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laktulose medic
3. Sådan skal du tage Laktulose medic
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Laktulose medic binder vand i tarmen og blødgør afføringen.
- Du kan bruge Laktulose medic mod kronisk forstoppelse.
- Du kan også bruge Laktulose medic til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt.

Lægen kan have givet dig Laktulose medic for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LAKTULOSE MEDIC

Tag ikke Laktulose medic, hvis:

- tarmen er blokeret (ved svulst eller betændelse)
- du har blindtarmsbetændelse
- du er overfølsom (allergisk) over for galactose
- du er overfølsom (allergisk) over for lactulose

Vær ekstra forsigtig med at tage Laktulose medic

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.

Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Laktulose medic dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B.

Brug af Laktulose medic sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Laktulose medic uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan tage Laktulose medic under graviditet.

Amning: Du kan tage Laktulose medic, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Laktulose medic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LAKTULOSE MEDIC

Den sædvanlige dosis er:

Mod forstoppelse:

Voksne og børn over 14 år: Du begynder med at tage 15-30 ml dagligt.

Når Laktulose medic virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Laktulose medic ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper.

Du skal tage en dosis, så din afføring bliver halvfast.

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt.

Kronisk behandling: Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange dagligt. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt.

Børn: Mod forstoppelse:

Børn under 5 måneder: 3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.

Børn 5-12 måneder: 10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.

Børn 1-14 år: 5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.

Barnet skal have Laktulose medic, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger, indtil behandlingen stoppes.

Du må ikke bruge Laktulose medic til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Laktulose medic til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Har du taget for meget Laktulose medic?

- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Laktulose medic, oral opløsning, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
- Tag pakningen med.

Hvis du har taget for meget Laktulose medic, kan du få diaré og tab af vand og salte.

4. BIVIRKNINGER

Laktulose medic kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Kvalme, opkastning og diaré ved høje doser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forhøjet natriumindhold i blodet ved behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt.

Hvis du igennem lang tid tager Laktulose medic, og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Laktulose medic utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Laktulose medic ved temperaturer over 25°C.

Tag ikke Laktulose medic efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Laktulose medic, 667 mg/ml, oral opløsning indeholder:

Det aktive stof er lactulose.

Derudover indeholder Laktulose medic rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Laktulose medic er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul.

Pakningsstørrelser: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

medic team a/s

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88 / Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Pharmadan A/S

Sognevejen 92

9620 Aalestrup

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011.