

Indlægsseddel: information til brugeren

Magnesia medic, 500 mg, filmoverttrukne tabletter

Magnesiumoxid, let

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Magnesia medic uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Magnesia medic.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic
3. Sådan skal du tage Magnesia medic
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnesia medic har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren.

Du kan bruge Magnesia medic mod:

- forstoppelse
- mavesår
- sår på tolvfingertarmen
- for meget mavesyre
- halsbrand
- sureopstød og svien i maven
- katar i spiserøret

Lægen kan have givet dig Magnesia medic for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic

Tag ikke Magnesia medic hvis:

- Du er overfølsom over for magnesium eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Du har kraftig nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør kun tage Magnesia medic mod mavesår efter aftale med lægen.

Langvarig brug af Magnesia medic kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. Kontakt din læge, hvis du tager Magnesia medic i længere tid.

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic.

Hvis du tager smertestillende medicin eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler) skal du være forsigtig med at anvende Magnesia medic. Magnesia medic kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.

Brug af anden medicin

Du må ikke tage Magnesia medic sammen med enterotabletter, da Magnesia medic kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket.

Du bør ikke tage Magnesia medic sammen med følgende lægemidler:

- D-vitamin (calcitriol)
- antibiotikum (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyclin)
- malariamiddel (chloroquin)
- middel, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
- middel (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
- antabus (disulfiram)

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia medic og følgende lægemidler:

- hjertemedicin (digoxin, sotalol)
- svampemiddel (itraconazol, ketoconazol)
- gigtmiddel (penicillamin)
- middel mod urinsur gig (allopurinol)
- middel til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia medic (kontakt lægen):

- acetylsalicylsyre (smertestillende og blodfortyndende middel)
- hjertemedicin (flecainid)
- middel til behandling af mani (lithium)
- allergimiddel (pseudoephedrin)
- smertestillende middel (diflunisal)

Der bør gå 1,5 time mellem indtagelse af Magnesia medic og jern, da Magnesia medic kan hæmme optagelsen af jern.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Magnesia medic sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnesia medic uafhængigt af måltiderne.

Ved mavesår bør du tage tabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Magnesia medic under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selvom du tager Magnesia medic.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia medic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Magnesia medic

Hvis din læge har ordineret Magnesia medic til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Syreneutraliserende:

1-2 tabletter efter behov.

Ved aktivt mavesår:

2-3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid.

Mod forstoppelse:

2-3 tabletter efter behov.

Det er vigtigt for den afførende virkning, at du sørger for at drikke rigelig med væske.

Den afførende virkning indtræder efter 6–8 timer.

Børn:

Du må kun bruge Magnesia medic til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyrefunktion:

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic.

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du har taget for meget Magnesia medic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Magnesia medic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed og lammelse, langsom puls og hjertestop.

4. Bivirkninger

Magnesia medic kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede:

Magnesiumforgiftning: sløvhed, muskellammelse, hjertesvigt (hos personer med nedsat nyrefunktion).

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede:

Hovedpine, diaré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Magnesia medic utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Magnesia medic ved almindelig temperatur.

Tag ikke Magnesia medic efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnesia medic filmovertukne tabletter, 500 mg indeholder:

Det aktive stof i Magnesia medic er Magnesiumoxid, let 500 mg tilsat som magnesiumhydroxid.

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, povidon, glycerol, kartoffelstivelse, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000.

Udseende:

Magnesia medic er en hvid, rund filmovertrukken tablet.

Pakningsstørrelser:

Magnesia medic fås i pakninger med 40 stk., 100 stk. eller 200 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88 / Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2015.