

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medilax Frugt, 667 mg/ml, oral opløsning Lactulose

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Medilax Frugt uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Medilax Frugt
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medilax Frugt
3. Sådan skal du tage Medilax Frugt
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Medilax Frugt binder vand i tarmen og blødgør afføringen.
- Du kan bruge Medilax Frugt mod kronisk forstoppelse.
- Du kan også bruge Medilax Frugt til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt.

Lægen kan have givet dig Medilax Frugt for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide før du begynder at tage Medilax Frugt

Tag ikke Medilax Frugt, hvis:

- tarmen er blokeret (ved svulst eller betændelse)
- du har blindtarmsbetændelse
- du er overfølsom (allergisk) over for galactose
- du er overfølsom (allergisk) over for lactulose

Vær ekstra forsigtig med at tage Medilax Frugt

Tal med lægen, hvis du har brug for afføringsmiddel hver dag, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.

Hvis du har sukkersyge og tager mere end 100-150 ml Medilax Frugt dagligt, skal du måske have mere insulin. Tal med lægen.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Brug af anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager vanddrivende midler, digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B.

Brug af Medilax Frugt sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Medilax Frugt uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Du kan tage Medilax Frugt under graviditet.

Amning: Du kan amme, selvom du tager Medilax Frugt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medilax Frugt påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Medilax Frugt**Den sædvanlige dosis er:****Mod forstoppelse:**

Voksne og børn over 14 år: Du begynder med at tage 15-30 ml dagligt.

Når Medilax Frugt virker, kan du nøjes med den halve dosis. Hvis Medilax Frugt ikke virker efter 3 dage, kan du fordoble dosis. Tal med din læge, hvis det ikke hjælper.

Du skal tage en dosis, så din afføring bliver halvfast.

Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt

Akut behandling: Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt.

Kronisk behandling: Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange dagligt. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt.

Børn: Mod forstoppelse:

Børn under 5 måneder:	3-6 ml dagligt fordelt på 2 doser.
Børn 5-12 måneder:	10 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.
Børn 1-14 år:	5-15 ml dagligt fordelt på 1-2 doser.

Barnet skal have Medilax Frugt, indtil afføringen er blevet normal. Det sker normalt i løbet af 7-10 dage. Derefter skal barnet have mindre og mindre doser de følgende uger og behandlingen stopper.

Du må ikke bruge Medilax Frugt til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Medilax Frugt til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Har du taget for meget Medilax Frugt?

- Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medilax Frugt, oral opløsning, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
- Tag pakningen med

Hvis du har taget for meget Medilax Frugt, kan du få diaré og tab af vand og salte.

4. Bivirkninger

Medilax Frugt kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Kvalme, opkastning og diaré ved høje doser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forhøjet natriumindhold i blodsvæsken ved behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt.

Hvis du igennem lang tid tager Medilax Frugt, og du har tynd afføring, kan du miste vand og salte.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Medilax Frugt utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Medilax Frugt ved temperaturer over 25°C

Anvend ikke Medilax Frugt efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Medilax Frugt, 667 mg/ml, oral opløsning indeholder:

Det aktive stof er lactulose.

Derudover indeholder Medilax Frugt rensed vand og frugtaroma (hindbær-appelsin).

Udseende og pakningsstørrelser

Medilax Frugt er en oral opløsning. Væsken skal være klar, lidt tyktflydende og farveløs til svagt brunliggul.

Pakningsstørrelser: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

medic team a/s

Solvang 8

3450 Allerød
Tlf.: 44 52 88 88 / Fax: 44 52 88 99
E-mailadresse: info@medicteam.dk

Fremstiller

Pharmadan A/S
Sognevejen 92
9620 Aalestrup

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2011.