

Information om Picolon, orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

1. Picolons virkning og hvad du skal bruge det til

- Picolon orale dråber er en klar farveløs væske.
- Picolon er et afføringsmiddel, der virker ved at fremme tarmens bevægelser.
- Du kan bruge Picolon mod forstoppelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Picolon

Tag ikke Picolon hvis:

- Du er overfølsom over for natriumpicosulfat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Picolon
- Du lider af manglende eller nedsat passage i mave eller tarm (f.eks. tarmslyng, forsnævring af tarmen eller betændelse i tarmen)
- Du for nylig er blevet opereret i mave eller tarm (f.eks. for blindtarmsbetændelse)
- Du lider af sygdom i mave eller tarm, der kræver operation

Særlige forholdsregler:

Tal med din læge, hvis du har brug for Picolon dagligt over længere perioder. Langvarig brug og store doser kan give forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalance, så du føler dig svag og kraftløs.

Tal med din læge, hvis du har

- betændelse i mave eller tarm
- forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalance

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Picolon orale dråber

Picolon orale dråber indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Picolon orale dråber indeholder methylparahydroxybenzoat (E218). Kan give allergiske reaktioner, som også kan optræde efter behandlingen.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Picolon efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Picolon efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Picolon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Vanddrivende medicin. Hvis du samtidig tager Picolon, kan du få forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance.
- Binyrebarkhormon (kortikosteroider). Hvis du samtidig tager Picolon, kan du få forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance.
- Hjertemedicin (digoxin). Picolon kan gøre dig mere følsom for digoxin.

3. Sådan skal du tage Picolon

Du må ikke bruge Picolon til børn under 4 år uden lægens anvisning.

Dosering

Voksne og børn over 10 år: 10-20 dråber (5-10 mg) daglig.

Børn 4 -10 år: 5-10 dråber daglig.

Børn under 4 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Tal med lægen

Du skal tage dråberne om aftenen, hvis du ønsker afføring næste morgen. Dråberne virker efter 6-12 timer. Du kan tage dråberne på en ske, i et glas vand, saft eller dryppet oven på mad.

Afdrypning

Hold flaskehalsen skråt nedadrettet mellem pege- og langfinger og tryk let med tommelfingeren på flaskens bund.

Har du taget for meget Picolon?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Picolon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tager du for stor dosis, kan du få diarré, mavekramper, svaghed og kraftsløse muskler.

Ved kronisk overforbrug af afføringsmidler kan du få kronisk diarré, mavesmerter, nyresten, nyrebeskadigelse og muskeltræthed.

Har du glemt at tage Picolon?

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

4. Bivirkninger

Picolon kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig overfølsomhedsreaktion. Der viser sig ved hævelse af huden og slimhinder. Ved hævelse i mund og svælge samt vejtrækningsbesvær kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Ubehag i maven, diarré, kramper og smerter i maven

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Hudreaktioner, bl.a. udslæt.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Picolon

Opbevar Picolon utilgængeligt for børn.

Brug ikke Picolon efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Picolon indeholder:

Det aktive stof i Picolon er Natriumpicosulfat, 7,5 mg/ml.

De øvrige indholdsstoffer er sorbitol; methylparahydroxybezoat (E218), rensset vand.

1 ml svarer til 15 dråber.

Markedsføring i Danmark:

Medic team a/s

Solvang 8

3450 Allerød

Fremstiller:

Scanpharm A/S

Topstykket 12

3460 Birkerød

Revideret maj 2007