

Information om Agiolax, granulat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Agiolax er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Agiolax
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du ikke får det bedre efter 3 dage eller du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Agiolax
3. Sådan skal du tage Agiolax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Agiolax er et naturlægemiddel, der indeholder hvide loppefrø, loppefrøskaller og sennesbælg. Agiolax har en vandbindende evne, så afføringen fylder mere og stimulerer derved tarmbevægelserne. Samtidig bliver afføringen blødere.
- Du kan tage Agiolax, hvis du har forstoppelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Agiolax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Agiolax

Tag ikke Agiolax hvis du:

- er overfølsom over for hvide loppefrø, loppefrøskaller, sennes eller nogle af de andre indholdsstoffer.
- har tarmslyng. Det viser sig ved:
 - smerter i mave eller tarm. Hvis du har eller får smerter, skal din læge undersøge dig.
 - kvalme og opkastning.
 - svær forstoppelse.
- har blokering af mave-tarmkanalen pga. en svulst eller betændelse.
- lider af alvorlig væskemangel eller forstyrrelser i saltbalancen.
- har sukkersyge, der er dårligt reguleret.
- har problemer med at synke.
- har pludselig ændring i afføringsmønsteret i mere end 2 uger.
- bløder fra endetarmen og ikke kender årsagen.
- har en akut mave-tarmsygdom, der kræver operation, f.eks. blindtarmsbetændelse.
- har betændelse i mave-tarmkanalen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Agiolax

Du skal kun tage Agiolax, hvis du ikke kan behandle forstoppelsen ved at spise en fiberrig kost eller ved at tage afføringsmidler, der kun indeholder fibre.

Tal med din læge, hvis du:

- er nødt til at tage afføringsmidler hver dag i mere end 2 uger, så lægen kan undersøge årsagen til forstoppelsen. Langvarig brug kan være vane-dannende og svække din tarmfunktion.
- har indeklemt afføring (svær forstoppelse).
- har gener i mave-tarmkanalen (f.eks. mavesmerter, kvalme eller opkastning), som du ikke kender årsagen til, eller generne er vedvarende.
- Hvis du stadig har forstoppelse efter 3 dages behandling med Agiolax

Hvis du får bryst smerter, opkastning, synkebesvær eller vejrtrækningsproblemer skal du straks opsøge læge

I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Agiolax.

Tal med din læge hvis du:

- har nedsat leverfunktion.
- har nedsat nyrefunktion.
- Har en anden alvorlig sygdom.

Behandling af svækkede og ældre patienter kræver overvågning fra fagpersonale.

Hvis du arbejder eller har arbejdet meget med loppefrø, har du større risiko for overfølsomhedsreaktioner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin).

Hvis du tager Agiolax i høj dosis eller i lang tid, kan det påvirke behandlingen med anden medicin eller øge risikoen for bivirkninger. Tal med din læge hvis du tager:

- medicin mod dårligt hjerte (digoxin, quinidin).
- vanddrivende medicin.
- tabletter med binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon eller hydrocortison).
- lakrids eller medicin, der indeholder lakrids, f.eks. hostemidler.

Hvis du har sukkersyge og tager insulin, skal du være særlig omhyggelig med at kontrollere dit blodsukker, da du måske skal have mindre insulin.

Indholdet af fibre i Agiolax kan forsinke optagelsen af anden medicin f.eks. vitaminer (vitamin B12), mineraler (f.eks. lithium), medicin mod dårligt hjerte (digoxin), blodfortyndende medicin (coumarinderivater), medicin mod epilepsi (carbamazepin). Du skal derfor tage Agiolax ½-1 time efter du har taget anden medicin.

Brug af Agiolax sammen med mad og drikke

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Agiolax sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Agiolax efter aftale med din læge.

Amning:

Du må ikke tage Agiolax, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Agiolax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdstoffer i Agiolax

Agiolax indeholder saccharose. Kontakt din læge, før du tager Agiolax, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Agiolax

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du følge lægens anvisning.

Dosering

Voksne og børn over 12 år:

1 måleske (5 g) om aftenen. Du skal drikke mindst ¼ liter væske samtidig med, at du tager Agiolax. Hvis det er nødvendigt, kan du også tage 1 måleske om morgenen.

Du skal tage den laveste dosis, som er nødvendig, for at du får en blød afføring. Du må højst tage 2 måleske Agiolax granulat daglig.

Virkningen indtræder i løbet af 8-12 timer.

Børn under 12 år:

Du må kun bruge Agiolax til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Har du taget for meget Agiolax?

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget mere Agiolax, end der står i denne information, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Hvis du tager så store doser, at du får tynd afføring, eller hvis du tager Agiolax i lang tid, er der risiko for forstyrrelser i væske- og saltbalancen, specielt lavt kalium, der viser sig ved svaghed og nedsat muskelkraft.

Ved længerevarende overdosering er der risiko for leverbetændelse.

Har du glemt at tage Agiolax?

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis.

4. Bivirkninger

Agiolax kan som al anden medicin give bivirkninger. På grund af sennes kan din urin få en rødlig misfarvning. Der er risiko for tilstopning af spiserøret og specielt forstoppelse i tarmen ved utilstrækkelig indtagelse af væske.

Alvorlige bivirkninger:

Sjælden bivirkning (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forstyrrelser i væske- og saltbalance, specielt for lavt kalium. Det viser sig ved svaghed og nedsat muskelkraft. Kontakt læge.

Meget sjælden bivirkning (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner i form af hævelser i ansigtet og vejrtrækningsbesvær, svimmelhed og lavt blodtryk. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelig – meget almindelig bivirkning (fore-

kommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

- Mavesmerter, mavekrampe, luft i maven. Disse bivirkninger optræder især, når du starter med at tage Agiolax.

Sjælden bivirkning (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Snue, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd. Langvarig brug kan medføre skummende urin, pga. æggehvite i urinen, mørkfarvning af tyktarmens slimhinde og blod i urinen (kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.)

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner på huden i form af kløe, nældefeber og eksem.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg apotek eller læge.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

<http://www.meldenbivirkning.dk/>.

5. Opbevaring

- Opbevar Agiolax utilgængeligt for børn
- Opbevar ikke Agiolax ved over 30 °C.
- Brug ikke Agiolax efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Aflever altid medicinrester på apoteket.

6. Yderligere information

Agiolax, granulat indeholder:

De aktive stoffer i Agiolax er hvide loppefrø, loppefrøskaller og Tinnevelly sennesbælg.

- 1 måleske (5 g) indeholder:
- 2,6 g hvide loppefrø
- 0,11 g loppefrøskaller
- 500-660 mg Tinnevelly sennesbælg svarende til 15 mg hydroxyanthracenglykosider

Øvrige indholdsstoffer:

- Kommenolie, salvieolie, pebermynteolie, akaciegummi, talcum, saccharose, rød, gul og sort jernoxid (E172), paraffin og paraffinolie.

Udseende: Agiolax er et brunt, kornet granulat.

Pakningsstørrelser: 250 g og 1000 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark

Madaus GmbH
Colonia Allee 15
51067 Köln
Tyskland

Repræsentant i Danmark

Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
Tlf.nr. 4452 8888
Fax: 4452 8899
e-mail: info.dk@meda.se

Revideret juni 2009