

Information om Matas Stærk C-vitamin tabletter 500 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge produktet.

Du kan få dette produkt uden recept. For at opnå den bedste virkning skal du altid følge vejledningen i denne information. Gem informationen. Du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller Matas.

Matas Stærk C-vitamin indeholder:

De aktive indholdsstoffer i tabletten er ascorbinsyre og natriumascorbat svarende til C-vitamin 500 mg. Hjælpestoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Markedsføres af:

Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød.

Tlf. 48 16 55 55.

E-mail: mail@matas.dk

1. Virkning og anvendelse

Matas Stærk C-vitamin er en aflang hvid tablet med delekærv.

Matas Stærk C-vitamin er et stærkt vitaminpræparat.

C-vitamin er en vigtig antioxidant. Vitamin C behovet er let øget ved større læsioner, forbrændinger og ved alvorlige betændelsestilstande. Behovet for vitamin C er let øget hos rygere. Indikation: Forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Matas Stærk C-vitamin.

Brug ikke Matas Stærk C-vitamin hvis:

Du er overfølsom overfor ascorbinsyre, natriumascorbat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Matas Stærk C-vitamin.

C-vitamin øger jernoptagelsen, og Matas Stærk C-vitamin bør derfor ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme. Bør heller ikke anvendes af personer med tendens til nyresten, med nedsat nyrefunktion eller glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel.

Særlige forholdsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Matas Stærk C-vitamin.

Brug af Matas Stærk C-vitamin sammen med mad og drikke. Du kan tage Matas Stærk C-vitamin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning.

Graviditet: Få vejledning hos lægen eller apoteket før du tager nogen form for medicin. Du kan tage Matas Stærk C-vitamin under graviditet.

Amning: Du kan amme, selvom du tager Matas Stærk C-vitamin.

Brug af anden medicin. Ved samtidig indtagelse af deferoxamin (jernbindende middel) forøges effekten af dette. Dette kan medføre behandlingsproblemer vedrørende hjertet, og derfor bør C-vitaminindtagelse undgås de første 2 uger af deferoxaminbehandling. Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en behandling med blodfortyndende medicin.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Matas Stærk C-vitamin

Dosering: Voksne: 1-2 tabletter daglig. Du må kun bruge Matas Stærk C-vitamin til børn under 2 år efter lægens anvisning. Tabletterne synkes hele med væske. Tabletterne er forsynet med delekærv og kan deles i 2 halvdele à 250 mg C-vitamin.

Har du taget for mange Matas Stærk C-vitamin? Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere af Matas Stærk C-vitamin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Ved indtagelse af store doser (mere end 1 g (mere end 2 tabletter)) kan ses blæreirritation og diarré. Store doser C-vitamin kan hos visse personer medføre risiko for forhøjet oxalindhold i urinen med risiko for stendannelse.

Ved overdosering kan muligvis ses en mangeltilstand efter pludseligt ophør med tilskuddet. Dette gælder også spædbørn, hvis mødre under graviditeten har indtaget store doser vitamin C.

Har du glemt at tage Matas Stærk C-vitamin? Behandlingen genoptages i den anbefalede dosis. Du må ikke tage ekstra doser for at kompensere for de doser, du har glemt.

4. Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger af Matas Stærk C-vitamin. Matas Stærk C-vitamin kan som al anden medicin give bivirkninger.

Fortæl læge eller Matas hvis du får bivirkninger, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Matas Stærk C-vitamin utilgængeligt for børn.

Opbevar Matas Stærk C-vitamin ved stuetemperatur (15-25°C).

Anvend ikke Matas Stærk C-vitamin efter den udløbsdato, der er anført på etiketten.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst revideret: januar 2006.