

Dosering

Voksne:

Dosis er individuel, fra ½ tablet til 4 tabletter daglig, dvs. fra 20 mg til 160 mg daglig.

Du skal fordele dosis på 1-3 doser. Følg altid lægens anvisning.

Børn:

Den daglige dosis følger barnets vægt. Følg lægens anvisning.

Fra ½ tablet på 20 mg til 1 tablet på 40 mg daglig.

Du skal fordele dosis på 1-3 doser (højst 40 mg daglig). Følg lægens anvisning.

Du kan normalt ikke anvende Lasix tabletter 40 mg til børn under 13 kg. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at forhøje dosis. Følg lægens anvisning.

Du skal anvende Lasix på tom mave, dvs. mindst ½ time før et måltid eller 2 timer efter et måltid. Du skal anvende tabletterne med et glas vand. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.

Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du anvendt for mange Lasix tabletter?

Kontakt skadestuen eller apoteket hvis du har anvendt flere Lasix tabletter end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en chok-tilstand, akut nyresvigt, svigtende blodforsyning til hjernen eller hjertet, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), blodprop, lammelse med slaphed og evt. bevidstløshed, sløvhed og forvirring.

Hos børn: Ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed, krampeanfald.

Har du glemt at anvende Lasix?

Har du glemt at tage en dosis Lasix, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Lasix kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium- og magnesium i blodet. Kalkaflejringer i nyrene ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl. Nedsat nyrefunktion med ophobning af affaldsstoffer i blodet.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Påvirkning af hjernen ved anvendelse til patienter med alvorlig leverlidelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødninger fra hud og slimhinder og infektion. Alvorlig hudsygdom (erythema multiforme). Unormal høj legemstemperatur hos børn født med hjertefejl. Vedvarende hørenedsættelse, besvimelse. Akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Alvorlig blodmangel, infektioner. Nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader med betændelses- og blødningstendens. Alvorlig påvirkning af hjertefunktionen. Akut betændelse i bugspytkirtlen (feber og voldsomme smerter i maven). Koldbrand i benene på grund af manglende blodtilførsel. Svær betændelse i huden, betændelse i blodkar (vaskulit). Gulsyn, meget hurtig puls.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Overfølsomhedreaktioner som pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lasix® 40 mg Tabletter

furosemid

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at anvende medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Lægen har ordineret Lasix til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller på apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får en bivirkning, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide før du begynder at tage Lasix
3. Sådan skal du anvende Lasix
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan anvende Lasix som vanddrivende middel, eller til at sænke blodtrykket. Lasix anvendes ved vand i kroppen (ødemer), som optræder ved f.eks. nedsat hjertefunktion, og ved forhøjet blodtryk (hypertension). Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE LASIX

Anvend ikke Lasix hvis du:

- Er overfølsom over for furosemid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Lasix.
- Er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider).
- Er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).
- Har for lavt blodtryk, eller lider af væskemangel (dehydrering).
- Har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
- Har for lidt kalium eller natrium i blodet.
- Har en alvorlig leversygdom.
- Er gravid eller ammer. (Se også afsnittet "Graviditet og amning").

Vær ekstra forsigtig med at anvende Lasix

Kontakt lægen, hvis du:

- Har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet.
- Har for lavt blodtryk.
- Enten har, eller er i risiko for at få diabetes.
- Lider af urinsyregigt (arthtritis urica).
- Dine nyrer ikke fungerer normalt på grund af alvorlig leversygdom.
- Lider af en bindevævssygdom (LED, systemisk lupus erythematosus).
- Har en alvorlig stofskiftesygdom (porfyri).
- Er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller med antibiotika (aminoglykosider).
- Er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider) eller
- Vanddrivende midler (thiazider).
- Har for lidt proteinstof i blodet.
- Har et langvarigt forbrug af afføringsmidler.

Du må kun give Lasix til for tidligt fødte børn efter lægens anvisning.

Du kan blive udelukket fra sportsstævner, hvis du anvender Lasix.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Lasix.

Anvendelse af anden medicin

Lasix kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Lasix.
Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod:

- kramper (chloralhydrat),
- kræft (cisplatin),
- mavesår (sukralfat, karbenoxolon),
- mani (lithium),
- forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere),
- hjertesvigt (digoxin og angiotensin II receptor-antagonister),
- smerter (NSAID, acetylsalicylsyre),
- for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol),
- binyrebarkhormon,
- urinsyreigt (probenecid),
- visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat),
- diabetes,
- astma (teophyllin),
- cyclosporin (anvendes ved transplantationer),
- epilepsi (phenytoin) eller du anvender
- antibiotika (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner) eller du anvender medicin der skal
- øge blodtrykket (fx adrenalin) eller medicin der
- afslapper musklerne eller hvis du
- spiser store mængder lakrids.

Hvis du skal have lavet røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du anvender Lasix.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Anvendelse af Lasix sammen med mad og drikke

Du skal tage Lasix på tom mave, dvs. mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid. Du skal tage Lasix sammen med et glas vand. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne.

Du må ikke spise lakrids, samtidig med du anvender Lasix, da det giver en større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun anvende Lasix efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke anvende Lasix, da Lasix bliver udskilt i modermælken og mælkemængden kan blive nedsat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lasix kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. F. eks. kan det give kraftigt blodtryksfald, som kan påvirke din koncentrationsevne og reaktionsevnen. Du bør i disse situationer ikke køre bil eller betjene maskiner. (Se også afsnittet om bivirkninger).

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Lasix

Lasix indeholder lactose. Kontakt lægen, før du anvender denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LASIX

Tag altid Lasix nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

evt. 112. Meget langsom puls (ved injektion eller infusion af furosemid), forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel. Hjertefejl hos fostret, øget risiko for alvorlig hjerte/lungefejl (patent ductus arteriosus) hos for tidligt fødte de første uger efter fødslen, stofskiftesygdom hos spædbørn, anfald af stofskiftesygdom (porfyri). Alvorlig leverlidelse og gulsot. Alvorlig nyresygdom med nyresvigt.

Hyppighed ikke angivet

Hjertearrytmier, chok-tilstand, kramper. Tendens til blodpropper. Betændelse i hjernen hos patienter med leversvigt med gulsot. Alvorlig hudlidelse med bylder (pemphigoid). Nyresten hos for tidligt fødte.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen. Øget mængde fedt i blodet, udslæt, kløe, nældefeber, blødninger i hud og slimhinder, øget hudfølsomhed for lys.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): Forhøjet blodsukker, væskemangel, forbigående døvhed, høreforstyrrelser, tinnitus, særligt hos patienter med nyreproblemer, lavt blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling, kvalme, opkastninger, diarré, eksem med afskalning af huden, betændelse i hudens blodkar, væskefyldte blærer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Synsforstyrrelser, hovedpine, prikkende/stikkende fornemmelse i huden, svimmelhed. Forværring af dårligt hjerte ved ophør af behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Vitaminmangel.

Hyppighed ikke angivet:

Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og mave, mavekrampe, forstoppelse, muskelkramper, stivkrampe, kraftsløshed. Lavt blodtryk.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end de her nævnte, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive opdateret.

Fortæl læge eller apotek, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger der ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du kan finde skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Lasix utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Lasix efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lasix tabletter er hvide, runde tabletter med delekærv, mærket ”DLI-DLI” på den ene side og  på den anden side.

Lasix indeholder:

Lasix, tabletter, 40 mg.

Det aktive indholdsstof i Lasix er furosemid.

De øvrige indholdsstoffer er: lactose; majsstivelse; prægelatineret majsstivelse; talcum; magnesiumstearat; vandfri silica kolloid.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Markedsføring og repræsentant i Danmark:

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie, 56 route de Choisy au Bac, 60205 Compiègne Cedex, Frankrig

Revideret 09/2008.