

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lasix Retard 30 mg depotkapsler Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lasix Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lasix Retard
3. Sådan skal du tage Lasix Retard
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Lasix Retard som vanddrivende middel, eller til at sænke blodtrykket. Du kan tage Lasix Retard ved vand i kroppen (ødemer), som optræder ved f.eks. nedsat hjertefunktion og ved forhøjet blodtryk (hypertension). Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lasix Retard

Tag ikke Lasix Retard

- hvis du er overfølsom over for furosemid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Lasix Retard.
- hvis du er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider).
- hvis du er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).
- hvis du har for lavt blodtryk eller lider af væskemangel.
- hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
- hvis du har et alvorligt lavt indhold af kalium eller natrium i blodet.
- hvis du har en alvorlig leversygdom.
- hvis du ammer (Se også afsnittet "Graviditet og amning").

Vær ekstra forsigtig med at tage Lasix Retard

- hvis du har for lavt blodtryk.
- hvis du har en øget risiko for kraftigt blodtryksfald, f.eks. hvis du har forsnævring i kranspulsåren eller i hjernen.
- hvis du enten har, eller er i risiko for at få diabetes.

- hvis du lider af urinsyregigt (arthrititis urica) eller har øget indhold af urinsyre i blodet.
- hvis dine nyrer ikke fungerer normalt på grund af alvorlig leversygdom.
- hvis du har for lidt proteinstof i blodet.
- hvis Lasix Retard gives til for tidligt fødte børn. Dette må kun ske efter lægens anvisning.
- hvis du lider af leversygdomme (cirrhose, ascites).
- hvis du lider af bindevævssygdommen lupus (systemisk lupus erythematosus).
- hvis du har problemer med at lade vandet f.eks. pga. forstørret prostata, urinrørsforsnævring eller blæretømningsproblemer.
- hvis du har en alvorlig stofskiftesygdom (porfyri).
- hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider) eller med antibiotika (aminoglykosider).
- hvis du har for lidt kalium eller natrium i blodet. Dette kan opstå ved væsketab, som f.eks. opkastninger, diarré, kraftig svedproduktion eller ved langvarigt forbrug af afføringsmidler.
- hvis du er ældre og er i behandling med medicin mod sindslidelser (risperidon)
- hvis du er overfølsom over for antibiotika (sulfonamider).
- hvis du er overfølsom over for vanddrivende midler (thiazider).

Du kan blive udelukket fra sportsstævner, hvis du tager Lasix Retard.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Lasix Retard.

Brug af anden medicin

Lasix Retard kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Lasix Retard.

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med medicin mod:

- kramper (chloralhydrat).
- betændelse/infektioner (antibiotika af aminoglykosid-typen, cefalosporiner).
- kræft (cisplatin).
- mavesår (sukralfat, karbenoxolon).
- mani (lithium).
- forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).
- hjertesvigt (digoxin og angiotensin II receptor-antagonister).
- sindslidelser (risperidon).
- smerter (NSAID, acetylsalicylsyre).
- for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol).
- epilepsi (phenytoin).
- Binyrebarkhormon.
- Forstoppelse.
- urinsyregigt (probenecid).
- visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat).
- diabetes.
- for lavt blodtryk (f.eks. adrenalin).
- spændte muskler.
- astma (teophyllin).
- immunsystemet, f.eks. ved transplantationer, gift eller psoriasis (cyclosporin).

Hvis du skal have lavet røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du tager Lasix Retard.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept.

Brug af Lasix Retard sammen med mad og drikke

Du bør tage Lasix Retard på tom mave, dvs. mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid. Du bør tage Lasix Retard sammen med et glas vand. Kapslerne kan synkes hele eller kan åbnes, og indholdet opslættes i kold væske umiddelbart før brug.

Du bør ikke spise lakrids, samtidig med du tager Lasix Retard, da det giver en større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Lasix Retard, efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Lasix Retard, da Lasix Retard bliver udskilt i modermælken og mælkemængden kan blive nedsat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lasix Retard kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. F.eks. kan det give kraftigt blodtryksfald, som kan påvirke din koncentrationsevne og reaktionsevnen. Du bør i disse situationer ikke køre bil eller betjene maskiner.

Vigtige informationer om nogle af hjælpestofferne

Lasix Retard indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager Lasix Retard, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis du har diabetes.

3. Sådan skal du tage Lasix Retard Tag altid Lasix Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Voksne:

Dosis er individuel. Den sædvanlige dosis er 30-120 mg daglig (dvs. fra 1 depotkapsel på 30 mg til 2 depotkapsler på 60 mg). Dosis kan dog komme op på 1500 mg daglig.

Du kan tage kapslerne som engangsdosis om morgenen, eller fordelt på 2 doser, morgen og middag. Følg altid lægens anvisning.

Du bør tage Lasix Retard på tom mave, dvs. mindst en halv time før eller 2 timer efter et måltid. Du bør tage Lasix Retard sammen med et glas vand. Kapslerne kan synkes hele eller kan åbnes, og indholdet opslættes i kold væske umiddelbart før brug.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at forhøje dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Lasix Retard depotkapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Lasix Retard depotkapsler end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomerne på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en shock-tilstand, akut nyresvigt, svigtende blodforsyning til hjernen eller hjertet, forvirringstilstande med hallucinationer, blodprop, lammelse med slaphed og evt. bevidstløshed, sløvhed og forvirring.

Hvis du har glemt at tage Lasix Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis Lasix Retard, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lasix Retard

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Lasix Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt læge eller skadestue hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Påvirkning af hjernen ved anvendelse til patienter med alvorlig leverlidelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. for få blodplader. Forringelse af hjertes pumpeevne hos patienter med dårlig hjerte. Alvorlig hudlidelse med bylder. Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Betændelse i blodkar. forhøjelse af legemstemperaturen hos spædbørn under 1 år med hjertesygdom.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/chok). Vævsdød hos ældre efter nedsat blodforsyning i benene. Nyresygdom (tubulo-interstitiel nefropati). Ved ophør med behandling kan der ske tilbagefald af åndenød, hoste, trykken for brystet og hurtig puls pga. dårligt hjerte.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed og træthed, tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet eller blodmangel. Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som f.eks. angst. forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel. Betændelse i bugspytkirtlen. Gulsot, ofte med hudkløe. Nyresygdom (Pseudo-Bartter's syndrom). Øget dannelse af hormon i biskjoldbruskkirtlen hos spædbørn.

Bivirkninger hvor hyppighed ikke er kendt:

Chok-tilstand. Tendens til blodpropper. Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven Johnson syndrom). Kraftig afskalning og afstødning af hud. Hududslæt pga. overfølsomhed mod Lasix. Stivkrampe. Hos for

tidligt fødte børn: smerter, ofte turevis i siden og bagtil i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Øget risiko for medfødt hjertefejl ved fødslen (patent ductus arteriosus).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel – især hos ældre mennesker.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hyppig vandladning. Mindre væske i blodbanen. Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet. Podagra. Øget urinmængde. Nedsættelse af evnen til at høre høje toner. Besvimelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Tørst, træthed pga. højt blodsukker. Høreforstyrrelser, typisk kortvarigt, men permanent døvhed kan forekomme ved høje doser, særlig hos patienter med nyresygdom. Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. Kvalme. Kløe. Nældefeber. Udslæt. Betændelse i huden med blærer. Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. Mindre blødning i hud og slimhinder. Allergiske reaktioner udløst af lys. Øget urinmængde.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse, især halsbetændelse og feber pga. for få hvide blodlegemer. Hovedpine. Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Svimmelhed. Synforstyrrelser, omgivelserne ses i et gulligt skær. Hurtig puls. Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Opkastning, diarré. Skummende urin, pga. æggehvite i urinen. Feber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Vitamin mangel (ved langvarig behandling). Susen for ørerne (tinnitus).

Bivirkninger hvor hyppighed ikke er kendt:

Tørst. Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet. Uregelmæssig puls pga. for lavt magnesium i blodet. Forvirring. Uregelmæssig puls. Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Spiseforstyrrelse. Irritation i mund og mave. Mavekramper. Forstoppelse. Kramper. Kraftnedsættelse. Forhøjet natrium i urinen. Forhøjet klorid i urinen. Urinophobning hos patienter med obstruktion af urinvejene. Impotens.

Lasix Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver herunder kolesterol, leverfunktion, elektrolytter etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Brug ikke Lasix Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Lasix Retard indeholder:

Aktivt stof: furosemid.

Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse; saccharose; polyvidon 25000; talcum; shellac; stearinsyre; aluminiumoxidhydrat; jernoxid gul (E 172); indigotin I (E 132); titandioxid (E 171); gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Lasix Retard depotkapsler har en gul bund og grøn top.

Lasix Retard depotkapsler 30 mg findes i pakninger af 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie, 1 rue de la vierge, 33565 Ambares, Carbon Blanc cedex, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2012