Åbnes her

Vnr 01 10 68

Surmontil® 25 mg

trimipramin.

Trimipramin. maleas respond.
Trimipramin. 25 mg
Constit. et color (E171) q.s.
Opbevares utilgængeligt for børn.
MTnr 4303 DK 11502045-00

100 tabl. *Aventis*

Surmontil® tabletter 25 mg

trimipramin.

Aventis

Lægen kan have givet dig Surmontil til anden brug eller i anden dosering end angivet i denne information. Hvis det er tilfældet, skal du rette dig efter lægens anvisninger.

Indholdsstoffer

Det virksomme stof er trimipramin 25 mg.
De øvrige indholdsstoffer er kartoffelstivelse, calciumhydrogenfosfat, talkum, magnesiumstearat, opadry.
Tabletterne er mærket SURMONTIL 25

Lægemiddelgruppe / Virkemåde

Surmontil er et lægemiddel, der virker mod depressioner. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes tricykliske antidepressiva.

Ansvarlig for markedsføringen i Danmark

Aventis Pharma A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.
Fremstiller: Aventis Pharma,S.A, Avda de Leganés nº 62, 28925 Alcorcón (Madrid), Spanien

Anvendelsesområde (indikation)

Surmontil tabletter anvendes til behandling af depressioner.

Hvornår må medicinen ikke bruges

Du må ikke bruge Surmontil:

- Hvis du har dårligt hjerte.
- Hvis du lider af skizofreni, som ikke bliver behandlet.
- Ved overfølsomhed overfor et af stofferne i medicinen.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Du skal kontakte din læge, hvis der opstår tegn på øget tryk i øjet (grøn stær. Dette kan vise sig ved f.eks. smerter og synspåvirkning).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid bør du ikke bruge Surmontil i første trimester af graviditeten (indtil udgangen af 12. graviditetsuge).
Du bør ikke bruge Surmontil, hvis du ammer.

Trafikfarlighed

Surmontil tabletter påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Samtidig indtagelse af medicin eller andet

Hvis alkohol, sovemidler, MAO-hæmmere (gruppe af lægemidler mod depression) eller adrenalin og noradrenalin bliver anvendt samtidig med Surmontil, er der risiko for, at stofferne påvirker hinandens virkning.
Tal med din læge, hvis du tager nogen anden form for medicin.

Dosering

Lægen bestemmer, hvor meget medicin du skal have.
Til voksne anbefales det normalt at begynde med 75 mg dagligt - fordelt på 3 doser. Herefter kan dosis øges gradvist til 150-300 mg dagligt - fordelt på 2 doser.
Den normale dosis, der skal til for at opretholde virkningen af Surmontil (vedligeholdelsesdosis), er 100-150 mg daglig.

Overdosering

Symptomer på overdosering er en generel forgiftningstilstand bestående af bl.a. udpræget tørhed i mund og slimhinder samt evt. forstoppelse og en mindre udskillelse af urin end normalt. Derudover kan der ses bevidstløshed, for lavt blodtryk samt en giftvirkning på hjertet.
Ved mistanke om overdosering skal du straks kontakte en læge.

Bivirkninger

Surmontil kan som al anden medicin give bivirkninger.
Følgende bivirkninger kan forekomme:
Tørhed i mund og slimhinder samt evt. forstoppelse og en mindre udskillelse af urin end normalt. Derudover kan der komme lavt blodtryk når man rejser sig til stående stilling samt andre bivirkninger relateret til kredsløbet, samt forstyrrelser i hjertets rytme.
Du skal kontakte lægen eller apoteket, hvis du får andre uventede eller uønskede virkninger.
Søg omgående læge, hvis der opstår en bivirkning som er alvorlig eller opstår pludseligt, eller hvis den hurtigt forværres.

Opbevaring

Du må ikke bruge Surmontil tabletter, hvis datoen som står på pakningen er overskredet.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Dato

April 2002.