

Lomudal® Inhalationsspray, suspension, 5 mg pr. dosis

natriumcromoglicat
sanofi aventis

Information om

Lomudal®
Inhalationsspray, suspension, 5 mg pr. dosis
Natriumcromoglicat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lomudal inhalationsspray til dig personligt. Lad derfor være med at give Lomudal inhalationsspray til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.



Indholdsfortegnelse:

1. Lomudal inhalationssprays virkning og hvad du skal anvende det til
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Lomudal inhalationsspray
3. Sådan skal du anvende Lomudal inhalationsspray
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Lomudal inhalationsspray
6. Yderligere oplysninger

1. LOMUDAL INHALATIONSSPRAYS VIRKNING OG HVAD DU SKAL ANVENDE DET TIL

Lomudal inhalationsspray, suspension hæmmer frigivelsen af en række stoffer, der medvirker til fremkaldelse af betændelse og allergiske reaktioner. Via denne mekanisme forebygger Lomudal inhalationsspray den astmatiske reaktion i lungen. Lomudal inhalationsspray, suspension anvendes til forebyggelse af bronkial astma. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE LOMUDAL INHALATIONSSPRAY

Anvend ikke Lomudal inhalationsspray:

- Hvis du er overfølsom (allergisk) overfor det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lomudal inhalationsspray 5 mg/dosis.
- Til akut behandling af astmaanfald eller ved stærkt og langvarigt anfald af bronkial astma, Lomudal inhalationsspray virker forebyggende og ikke mod anfald. Da behandlingen er forebyggende, er det vigtigt at du fortsætter med anvendelsen, hvis du har fordel af behandlingen.

Stop behandlingen med Lomudal inhalationsspray hvis:

Du får en speciel form for lungebetændelse (eosinofil pneumoni).

Vær særlig opmærksom:

- Hvis du også er i steroidbehandling og denne behandling nedsættes samtidig med at du behandles med Lomudal inhalationsspray, suspension, bør du følges nøje af lægen. Du kan eventuelt anvende "peak flow" bestemmelse (metode til at måle lungefunktion) mens din steroidbehandling nedtrappes. Hvis dine astmasymptomer bliver forværrede, skal du søge læge.

- Hvis det er nødvendigt at indstille behandlingen, bør dette gøres langsomt over en uge. Symptomer på astma kan opstå som følge af behandlingsstopet.

Anvendelse af anden medicin

Lomudal inhalationsspray, suspension påvirker ikke/påvirkes ikke af anden medicin. Fortæl altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du anvender nogen form for medicin.

Graviditet:

Må kun anvendes efter lægens anvisning. Lomudal inhalationsspray, suspension kan anvendes under graviditet, når de forventede fordele for moderen kan opveje den mulige risiko for fostret. Erfaringen viser ingen virkning på fosterudviklingen. Som ved al medicin bør der udvises forsigtighed, specielt i de første tre måneder af graviditeten.

Amning:

Lomudal inhalationsspray, suspension kan anvendes i ammeperioden, når de forventede fordele for moderen kan opveje den mulige risiko for barnet. Natriumcromoglicat udskilles kun i ringe grad i modermælk. Der foreligger ingen meddelelser om bivirkninger hos det ammede barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal inhalationsspray, suspension påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE LOMUDAL INHALATIONSSPRAY

Anvend altid Lomudal inhalationsspray nøjagtig efter lægens anvisning. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Børn og voksne: 5-10 mg (1-2 inhalationer) 4 gange daglig. Behandling med Lomudal inhalationsspray, suspension er forebyggende, det er derfor vigtigt at overholde den regelmæssige dosering. Det kan være nødvendigt med

flere doser, før der opnås en effekt, der kan i nogle tilfælde gå nogle uger, inden fuld effekt er opnået.

I alvorlige tilfælde eller i perioder med ekstra påvirkning af allergener kan dosis forøges til 2 inhalationer 6-8 gange daglig.

Når astmaen er stabiliseret, er det nogle gange muligt at nedsætte dosis, men dette skal du aftale med lægen for at sikre, at der er tilstrækkelig kontrol med din astma.

Hvis du er i behandling med steroider og starter behandling med Lomudal inhalationsspray, suspension, kan behandlingen med steroider muligvis nedsættes eller stoppes.

Du kan forebygge anstrengelsesudløst astma eller andre kendte udløsende årsager ved at anvende Lomudal inhalationsspray, suspension 15-30 minutter før du udsættes for den udløsende årsag.

Lomudal inhalationsspray, suspension er forebyggende medicin og har ingen virkning på et allerede udløst anfald.

Brugervejledning

Før inhalationssprayen anvendes første gang, skal den gøres klar ved at trykke 4 pust ud i luften før du inhalerer. Hvis inhalationssprayen ikke har været i brug i mere end 3 dage, skal der trykkes 2 pust ud i luften før du inhalerer.

Til forældre: Børn kan behøve nogen hjælp til at bruge inhalationssprayen korrekt. I kan hjælpe med at presse på sprayen, lige efter barnet har startet indåndingen.

Korrekt anvendelse af Lomudal inhalationsspray.

Fig. 1:

Fjern beskyttelseshætten fra mundstykket og ryst sprayen godt.






Fig. 2:

Hold sprayen et stykke væk fra munden, som vist. Foretag en god udånding (ånd ikke helt ud). ÅND IKKE ud gennem mundstykket, da dette kan tilstoppe sprayen.




Fig. 3:

Tag mundstykket i munden og luk læberne omkring det. Efter at indånding gennem munden er påbegyndt - presses sprayen ned, som vist på tegningen, for at frigive pulveret – og samtidig fortsættes indåndingen.



Fig. 4:

Fjern mundstykket fra munden og hold vejret et stykke tid inden udånding.





Fig. 5:

Hvis mere end et pust er ordineret, **VENT 1 MINUT. GENTAG 2,3 og 4.** Efter brug sættes beskyttelseshætten igen på mundstykket.


RENGØRING

Det er vigtigt at holde de hvide plasticdele fri for pulverrester, da ventilen ellers kan tilstoppes. Plasticdelene skal rengøres mindst hver tredje dag. Eftersom det er vigtigt at delene tørrer ordentligt, kan det være praktisk at skifte mellem to sprays.




1. Tag beskyttelseshætten af og metalbeholderen ud af plastic inhalatoren

2. Skyl plastic inhalatoren ovenfra i håndvarmt vand i et minut




3. Vend plastic inhalatoren og skyl fra den anden side, i håndvarmt vand i et minut.




4. Fjern overskydende vand indvendigt ved at banke plastic inhalatoren mod et hårdt underlag.



5. Det er vigtigt at alt vandet er væk fra det sted, hvor forstøveren på metalbeholderen passer ind.




6. Lad plastic inhalatoren tørre natten over.



7. Vær sikker på at plastic inhalatoren er helt tør før metalbeholderen sættes igen, og at det hvide gummilåg slutter tæt til metalbeholderen.

Vigtigt

Hvis inhalatoren bliver tilstoppet, så fjern beskyttelseshætten og metalbeholderen og skyl plastic inhalatoren i varmt vand i 20 minutter. Derefter udføres trin 2 til 6. Forsøg aldrig at rengøre et blokeret mundstykke med en pind eller lignende. Dette vil ødelægge inhalatoren. Læg ikke metalbeholderen i vand og fjern ikke det hvide gummilåg fra metalbeholderen.



Lomudal inhalationsspray, suspension er en trykbeholder. Må ikke punkteres eller brændes, når den tom. Beskyttes mod sollys og temperaturer over 50° C.

Hvis du har anvendt for meget Lomudal inhalationsspray

Der er ikke set tilfælde af overdosering efter anvendelse af Lomudal inhalationsspray, suspension.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Lomudal inhalationsspray, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at anvende Lomudal inhalationsspray

Har du glemt at anvende Lomudal inhalationsspray, fortsætter du blot med at tage næste dosis som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Lomudal inhalationsspray kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Mere end 1 ud af 10.000 og mindre end 1 ud af 1.000 kan opleve utilsigtede sammentrækninger af luftvejene (Behandlingen bør stoppes og anden behandling igangsættes).

Meget sjældne bivirkninger: Mindre end 1 ud af 10.000 kan opleve en speciel form for lungebetændelse (eosinofil pneumoni). Overfølsomhedsreaktioner med anfaldsvis væskeansamling i hud og slimhinder, krampelignende sammentrækning af muskulaturen omkring bronkierne, lavt blodtryk og kollaps.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Mere end 1 ud af 100 og mindre end en ud af 10 kan opleve svælgirritation, hoste og forbigående krampelignende sammentrækning af muskulaturen omkring bronkierne.

Meget sjældne bivirkninger: Mindre end 1 ud af 10.000 kan opleve overfølsomhedsreaktioner.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end de her nævnte, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive opdateret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "BIVIRKNINGER" på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU LOMUDAL INHALATIONSSPRAY

Lomudal inhalationsspray, suspension må ikke opbevares i køleskab eller fryser. Da beholderen er under tryk, bør den beskyttes mod varme og direkte sollys og bør ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. Lomudal inhalationsspray skal opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Lomudal inhalationsspray, suspension efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lomudal inhalationsspray suspension, 5 mg/dosis (1 pust) indeholder:

Aktivt stof: Natriumcromoglicat.
Øvrige indholdsstoffer: Povidon K 28-32, polyethylenglycol 600 og heptafluoropropan (HFA-227).

Lomudal inhalationssprays udseende og pakningsstørrelse

Lomudal inhalationsspray er en suspension (opslemning) af et hvidt pulver i et flygtigt drivmiddel. Lomudal inhalationsspray sælges i pakninger à 2x112 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: sanofi-aventis Danmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller:

Aventis Ltd. London Road, Holmes Chapel, Cheshire CW4 8BE, England.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Januar 2007.