



Orudis[®] 25 mg/g, Gel

ketoprofen

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Orudis uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Orudis.
- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Orudis
3. Sådan skal du anvende Orudis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Orudis dæmper betændelse og er smertestillende. Orudis tilhører gruppen af non-steroid antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan bruge Orudis mod smerter, ømhed og hævelse i muskler og led pga. betændelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Orudis for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE ORUDIS

Anvend ikke Orudis, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for ketoprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har haft astma, allergi eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
- er gravid i 7.-9. måned.

Vær ekstra forsigtig med at anvende Orudis

Vær opmærksom på følgende

- Du må ikke bruge Orudis i øjne, på slimhinder, på åbne sår, beskadiget hud eller ved hudsygdomme.
- Orudis kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen.
- Du må ikke bruge Orudis under tætsluttende forbindelse.

- Hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Orudis udløse astmalignende anfald.
- Du kan blive overfølsom efter lang tids brug af Orudis. Får du udslæt, skal du stoppe behandlingen.
- De behandlede hudområder må ikke udsættes for sollys eller solarielys under behandlingen samt i 2 uger derefter.
- Vask hænderne efter påsmøring, medmindre du behandler hænderne.
- Hvis du er i behandling med medicin mod betændelse (metronidazol) eller disulfiram (middel mod alkoholmisbrug), så tal med lægen, da Orudis indeholder små mængder alkohol.

Kontakt lægen, hvis du

- får du irritation eller udslæt af Orudis
- har eller har haft dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Orudis indeholder alkohol. Hvis du er i behandling med disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Orudis uden først at tale med lægen eller apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Orudis efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Orudis i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Orudis efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Orudis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Orudis

Orudis indeholder alkohol (ethanol). Hvis du er i behandling med disulfiram (middel mod alkoholmisbrug) eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke anvende Orudis uden først at tale med lægen eller apoteket.



228338

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE ORUDIS

Hvis din læge har ordineret Orudis til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Orudis er til udvortes brug.

Den sædvanlige dosis er Voksne og børn over 2 år

Smør Orudis gel på det angrebne hudområde 2-4 gange daglig.

Vask hænderne efter endt påsmøring, medmindre du behandler hænderne.

Børn

Du må kun bruge Orudis til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindelse.

Hvis du har brugt for meget Orudis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Orudis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at anvende Orudis

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge Orudis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at anvende Orudis

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Orudis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Blodig opkastning og /eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Rødmen af huden.
- Kløe.
- Eksem.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Øget følsomhed af huden for lys.
- Nældefeber.
- Betændelse i huden med blærer.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Forværring i nyresygdom.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
- Diarré.
- Kontakteksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Orudis ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Orudis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Orudis gel 25 mg/g, gel indeholder

Aktivt stof: Ketoprofen.

Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, triethanolamin, lavendelolie, ethanol, rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Ensartet, farveløs, gennemsigtig gel med en duft af lavendel.

Pakningsstørrelser

Tube med 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie, 196, rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2008