

Orudis® hårde kapsler, 50 mg og 100 mg

Ketoprofen.

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende medicinen

- Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Orudis til dig personligt. Lad derfor være med at give Orudis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Over sight over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Orudis
3. Sådan skal du anvende Orudis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Orudis er et smertestillende og betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Orudis:

- til behandling af gigtsygdomme
- til behandling af smerter og hævelse i led og muskler
- ved svære menstruationssmerter

Lægen kan have givet dig Orudis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE ORUDIS

Anvend ikke Orudis hvis du:

- er overfølsom (allergisk) overfor ketoprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orudis
- tidligere har haft tegn på astma, astmatiske anfald eller andre former for allergi efter brug af andre gigtmidler af NSAID-gruppen ("non-steroide antiinflammatoriske stoffer") herunder acetylsalicylsyre
- har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID), eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang.
- lider af alvorlig mangel på blodplader (trombocytopeni) med tendens til blødning fra hud og slimhinder
- har dårligt fungerende hjerte
- har dårligt fungerende lever
- har dårligt fungerende nyrer
- er gravid i 7. til 9. måned

Vær ekstra forsigtig med at anvende Orudis

Vær opmærksom på følgende:

- Brug af Orudis kan være forbundet med let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
- Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener du er i risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
- Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du anvender Orudis, skal du stoppe med at anvende medicinen og kontakte læge eller skadestue.
- Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
- Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Orudis, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen
- Orudis kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid
- Orudis kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.

Tal med lægen, inden du anvender Orudis, hvis du:

- Tager anden smertestillende medicin (NSAID, herunder COX-hæmmere mod ledlidelser)
- Har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller

betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID

- Har astma
- Har dårlige nyrer
- Har dårlig lever
- Tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.

Kontakt lægen, hvis du får uklart eller sløret syn.

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Så længe du får Orudis, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Orudis. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din læge eller apoteket.

Anvendelse af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge inden behandling med Orudis hvis du anvender:

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre). Medicin mod mani og depression (litium og SSRI). Tabletter med binyrebarkhormoner. Anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser). Medicin mod ledegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat). Medicin mod kredsløbsforstyrrelser i benene (pentoxifyllin). Vanddrivende medicin (f.eks. furosemid). Hjertemedicin (ACE-hæmmere, angiotensin II antagonist). Medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere). Medicin mod urinsur gigt (probenecid). Medicin der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus).

Fortæl det til lægen, hvis du bruger spiral som svangerskabsforebyggelse, da virkningen af spiralen kan nedsættes, og du risikerer at blive gravid.

Anvendelse af Orudis sammen med mad og drikkevarer

Du kan anvende Orudis sammen med mad og drikke.

Du skal tage kapslerne med et glas vand og i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke anvende Orudis de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

Du må kun tage Orudis i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal være så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Amning:

Du må ikke anvende Orudis, når du ammer, da Orudis går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Orudis kan give bivirkninger (døsighed, svimmelhed, sløret syn og krampetrækninger), som større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Orudis hårde depotkapsler

Orudis hårde kapsler indeholder laktose. Kontakt lægen, før du anvender denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Orudis 100 mg hårde kapsler indeholder sojalecithin, der kan indeholde sojaprotein. Dette kan udløse allergiske reaktioner, hvis du er allergisk overfor jordnødder (peanuts) eller soja.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE ORUDIS

Orudis® hårde kapsler, 50 mg og 100 mg

Ketoprofen.

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at anvende medicinen

- Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Orudis til dig personligt. Lad derfor være med at give Orudis til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Over sight over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at anvende Orudis
3. Sådan skal du anvende Orudis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Orudis er et smertestillende og betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Orudis:

- til behandling af gigtsygdomme
- til behandling af smerter og hævelse i led og muskler
- ved svære menstruationssmerter

Lægen kan have givet dig Orudis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE ORUDIS

Anvend ikke Orudis hvis du:

- er overfølsom (allergisk) overfor ketoprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orudis
- tidligere har haft tegn på astma, astmatiske anfald eller andre former for allergi efter brug af andre gigtmidler af NSAID-gruppen ("non-steroide antiinflammatoriske stoffer") herunder acetylsalicylsyre
- har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID), eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang.
- lider af alvorlig mangel på blodplader (trombocytopeni) med tendens til blødning fra hud og slimhinder
- har dårligt fungerende hjerte
- har dårligt fungerende lever
- har dårligt fungerende nyrer
- er gravid i 7. til 9. måned

Vær ekstra forsigtig med at anvende Orudis

Vær opmærksom på følgende:

- Brug af Orudis kan være forbundet med let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
- Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener du er i risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
- Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du anvender Orudis, skal du stoppe med at anvende medicinen og kontakte læge eller skadestue.
- Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
- Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Orudis, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen
- Orudis kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid
- Orudis kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.

Tal med lægen, inden du anvender Orudis, hvis du:

- Tager anden smertestillende medicin (NSAID, herunder COX-hæmmere mod ledlidelser)
- Har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller

betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID

- Har astma
- Har dårlige nyrer
- Har dårlig lever
- Tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.

Kontakt lægen, hvis du får uklart eller sløret syn.

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner.

Så længe du får Orudis, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Orudis. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din læge eller apoteket.

Anvendelse af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du anvender anden medicin eller har anvendt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge inden behandling med Orudis hvis du anvender:

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre). Medicin mod mani og depression (litium og SSRI). Tabletter med binyrebarkhormoner. Anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser). Medicin mod ledegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat). Medicin mod kredsløbsforstyrrelser i benene (pentoxifyllin). Vanddrivende medicin (f.eks. furosemid). Hjertemedicin (ACE-hæmmere, angiotensin II antagonist). Medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere). Medicin mod urinsur gigt (probenecid). Medicin der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin, tacrolimus). Fortæl det til lægen, hvis du bruger spiral som svangerskabsforebyggelse, da virkningen af spiralen kan nedsættes, og du risikerer at blive gravid.

Anvendelse af Orudis sammen med mad og drikkevarer

Du kan anvende Orudis sammen med mad og drikke.

Du skal tage kapslerne med et glas vand og i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke anvende Orudis de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.

Du må kun tage Orudis i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal være så kort tid som muligt. Tal med lægen.

Amning:

Du må ikke anvende Orudis, når du ammer, da Orudis går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Orudis kan give bivirkninger (døsighed, svimmelhed, sløret syn og krampetrækninger), som større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Orudis hårde depotkapsler

Orudis hårde kapsler indeholder laktose. Kontakt lægen, før du anvender denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Orudis 100 mg hårde kapsler indeholder sojalecithin, der kan indeholde sojaprotein. Dette kan udløse allergiske reaktioner, hvis du er allergisk overfor jordnødder (peanuts) eller soja.

3. SÅDAN SKAL DU ANVENDE ORUDIS