

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Logimax® depottabletter

metoprolol og felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen:

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Logimax til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Logimax
3. Sådan skal du bruge Logimax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Logimax indeholder to virksomme stoffer, der tilhører to forskellige lægemiddelgrupper. *Metoprolol* er en beta₁-selektiv-betablokker, og *felodipin* er en calcium-antagonist.
- Logimax sænker blodtrykket. De to virksomme stoffer virker på hver sin måde. Metoprolol får hjertet til at arbejde roligere og mere stabilt. Felodipin sænker blodtrykket ved at udvide blodkarrene og derved gøre det lettere for hjertet at pumpe blodet gennem disse blodkar.
- Logimax bruges mod forhøjet blodtryk. Det gives til de patienter, hvor ét lægemiddelstof ikke har sænket blodtrykket tilstrækkeligt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LOGIMAX

Brug ikke Logimax

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for metoprolol eller felodipin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er gravid.
- Ved pludselig opstået hjertetilfælde (akut myokardieinfarkt).
- Du har ustabile hjertesmerter (angina pectoris).
- Du har rytmeforstyrrelser i hjertet (atrioventrikulær blok af anden eller tredje grad).
- Du har ubehandlet hjertesvigt.
- Du har langsom hjerterytm (sinusbradykardi).
- Du har uregelmæssig hjerterytm (syg sinus).
- Du har nedsat pumpefunktion i hjertet.
- Du har meget dårlig blodcirkulation.
- Du har forsnævringer i hjerteklapperne.
- Du har blokeret udløb fra hjertet.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Logimax

- Der bør udvises forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme.
- Tal med din læge, hvis du har sukkersyge.
- Du må ikke stoppe behandlingen uden først at tale med din læge. Hvis behandlingen stoppes, skal det ske gradvist over 1-2 uger.
- Tal med din læge hvis du har fæokromocytom (en sjælden kræfttype).
- Hvis du skal indlægges eller opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Logimax.
- Tal med din læge hvis du oplever en meget langsom hjerterytm, som bliver ved eller forstærkes – dosis skal måske ændres.
- Tal med din læge, hvis du har meget dårlig blodcirkulation i hænder og fødder.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Visse andre lægemidler påvirker eller påvirkes af behandling med Logimax.

Nogle stoffer *forstærker* virkningen af Logimax: Lægemidler til hjerte- eller kredsløbssygdomme (f.eks. verapamil, chinidin, propafenon, hydralazin, andre beta-blokkere og calcium-antagonister), cimetidin (mod mavesår/mavesyre), diphenhydramin (mod allergier) erythromycin (mod infektioner), itraconazol og ketokonazol, terbinafin (svampemidler), serotonin-genoptagelses-hæmmere (mod depression), lægemidler mod psykiske sygdomme, alkohol, lægemidler mod HIV (ritonavir).

Nogle stoffer *formindsker* virkningen af Logimax: Rifampicin (antibiotika), indomethacin (mod gigt), fenytoin, carbamazepin (mod epilepsi), efavirenz, nevirapine (lægemidler mod HIV) barbiturater (sove medicin), visse stoffer i grapefrugtjuice, visse stoffer i Perikum (*Hypericum perforatum*).

Rådfør dig også med lægen, hvis du får MAO-hæmmere mod depression (isocarbazid, moclobemid), tacrolimus (anvendes efter transplantation), andre beta-blokkere (f.eks. visse øjendråber), clonidin (mod migræne), eller hvis du har sukkersyge (måske skal dosis ændres).

Brug af Logimax sammen med mad og drikke

Du kan tage Logimax sammen med mad og drikke. Du bør dog ikke tage Logimax med grapefrugtjuice eller et måltid med højt fedtindhold.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Logimax under graviditet.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Logimax efter aftale med lægen. Logimax går over i brystmælk, men normalt i så små mængder, at risikoen for bivirkninger hos barnet er ubetydelig såfremt moderen behandles med normal dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Logimax kan hos enkelte give bivirkninger (svimmelhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig før du kører bil eller betjener farlige maskiner.

AstraZeneca



Schawk Job No.: 294600-A01
Date: 03-03-11
Ops Component Code: 6804487.05
Drawing Ref: AZL4004A
Pharma Code: 4155
Description: Logimax 5/50 mg Leaflet: Patient DK

Printable Colours:



Black

Non Print:



Technical Info



Profile

SCHAWKI

TEXT AREA FOR ARTWORK

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Logimax

Logimax depottabletter indeholder lactose. Hvis du af din læge har fået at vide, at der er visse sukkerarter, du ikke kan tåle, bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LOGIMAX

Brug altid Logimax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 tablet daglig. Af og til kan dosis øges til 2 tabletter daglig. Tabletterne bør tages om morgenen. De synkes hele med rigelig væske. De må ikke deles, tygges eller knuses

Brug til børn

Der er ingen erfaring med Logimax til børn

Hvis du har brugt for mange Logimax depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Logimax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer ved overdosis: For lavt blodtryk, langsom puls, rytmeforstyrrelser i hjertet, nedsat pumpefunktion, bevidsthedstab (evt. koma), kvalme, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder, shock, hjertestop og krampe i åndedrætsmusklerne.

Hvis du har glemt at tage Logimax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis der er mere end 12 timer til din næste normale dosis, bør du tage tabletten med det samme og da fortsætte med næste dosis på det normale tidspunkt.

Hvis du holder op med at bruge Logimax

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Logimax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Træthed.

Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Hovedpine, væskeansamlinger, rødme, langsom puls, svimmelhed, lavt blodtryk, kolde hænder og fødder, hjertebanken, mavesmerter, kvalme, diarré, forstoppelse, åndenød ved fysisk aktivitet.

Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Hurtig puls, brystsmærter, hududslæt, kløe, forbigående forværring af de symptomer man har, hvis man lider af nedsat hjertefunktion, lettere rytmeforstyrrelser i hjertet (AV-blok I), muskelkrampe, opkastning, vægtøgning, depression, nedsat koncentrationsevne, søvnforstyrrelser, mareridt, føleforstyrrelser (brændende, prikkende eller følelsesløs fornemmelse), sammentrækning af bronkierne, øget svedtendens.

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Besvimelse, muskel- og ledsmerter, overledningsforstyrrelser i hjertet og uregelmæssig hjerterytme, mundtørhed, afvigelse i levertal, nervøsitet, angst, impotens, høfeber, synsforstyrrelser, tørre og/eller irriterede øjne, øjenbetændelse, hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Tandkødsfortykkelse, forhøjede levertal, lysoverfølsomhed, karbetændelse, koldbrand (hos patienter med svære kredsløbsforstyrrelser), ændringer i blodbilledet, hukommelsestab/nedsat hukommelse, konfusion, hallucinationer, ringen for ørerne (tinnitus), smagsforstyrrelser, forværring af psoriasis, leverbetændelse, angioødem (allergisk reaktion med hævelse i huden), feber, hyppig vandladning

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel

Brug ikke Logimax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Udl. dato) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Logimax indeholder:

- Aktive stoffer: Metoprolol (50 mg pr. depottablet) og felodipin (5 mg pr. depottablet).
- Øvrige indholdsstoffer: Lactose vandfri, silica kolloid vandfri, ethylcellulose, hypromellose, natriumaluminiumsilikat, mikrokrySTALLinsk cellulose, polyoxyl 40 hydrogeneret ricinusolie, propylgallat, hydroxypropylcellulose, natriumstearylfulmarat, macrogol 6000, paraffin, titandioxid (E 171), gul og rødbrun jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Logimax depottabletten er rund, orangefarvet og mærket A/FG på den ene side.

Logimax findes i pakninger af 28 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

AstraZeneca A/S
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tlf.: 43 66 64 62

Fremstiller:

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2011

© AstraZeneca 2011

AstraZeneca



AstraZeneca



Schawk Job No.: 294600-A01
Date: 03-03-11
Ops Component Code: 6804487.05
Drawing Ref: AZL4004A
Pharma Code: 4155
Description: Logimax 5/50 mg Leaflet: Patient DK

Printable Colours:



Black

Non Print:



Technical Info



Profile

SCHAWKI

Bar prints 100mm @ 100%