

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Primperan®
tabletter 10 mg

Metoclopramidhydrochlorid

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Primperan til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primperan
3. Sådan skal du tage Primperan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Primperan dæmper kvalme og fremskynder madens passage gennem maven, så du ikke kaster op. Du kan anvende Primperan ved kvalme og opkastning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PRIMPERAN

Tag ikke Primperan, hvis:

- Du er overfølsom overfor metoclopramid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Primperan tabletter
- Du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
- Du lider af blødninger eller forsnavringer i mave-tarmkanalen eller perforering af mave-tarmkanalen
- Du lider af ufrivillige bevægelser

- Du anvender medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa)

Vær ekstra forsigtig med at anvende Primperan

Du bør ikke tage Primperan, hvis du har epilepsi, tal med din læge. Hos børn, unge og ældre kan der forekomme ufrivillige bevægelser, dette ses ved høje doser. Disse vil dog forsvinde igen ved behandlingens ophør. Kontakt eventuelt din læge.

Det er vigtigt, at du overholder tidsintervallet mellem doserne af Primperan, der skal gå mindst 6 timer imellem to doser hos børn under 15 år, også selv om barnet kaster medicinen op.

Du bør ikke drikke alkohol, så længe du tager Primperan.

Hvis du har eller har haft Parkinsons sygdom eller en depression, så tal med din læge inden du tager Primperan.

Hvis din lever eller dine nyrer ikke fungerer normalt, skal din dosis halveres. Følg lægens anvisninger.

/Eldre bør kun tage Primperan med forsigtighed.

/Eldre bør ikke tage Primperan mod mindre symptomer i længere tid.

Du skal kontakte din læge, hvis du får feber, ufrivillige bevægelser (tardiv dyskinesi) eller kraftige muskelspændinger, stop med behandlingen, indtil du har talt med lægen. På grund af øget risiko for disse bivirkninger må du ikke tage Primperan i mere end 3 måneder. Tal med din læge hvis du er i tvivl.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Du må ikke tage Primperan, hvis du også er i behandling med medicin, der indeholder levodopa (middel mod Parkinson).

Tal med din læge, hvis du tager:

- Stærk smertestillende medicin (morfin og lignende)
- Medicin mod spasmer i mave eller tarm (antikolinergika)
- Medicin, der hæmmer centralnervesystemet (sovemidler, midler, der indeholder morfin eller morfinlignende stoffer, angstdæmpende medicin, sløvende antihistaminer, (overfølsomhed) sløvende midler mod depression, barbiturater, epilepsi midler, clonidin og lignende stoffer. (Den sløvende effekt af alle disse midler forstærkes)midler forstærkes)

11502973-02

- Nervemedicin (f.eks. phenothiaziner)
- Digoxin (hjertemedicin)
- Cyclosporin (midler, der nedsætter immunforsvaret)
- Suxamethonium og mivaurium (midler til bedøvelse)
- Lithium (middel mod depression og mani)
- Acetylsalicylsyre og paracetamol (smertestillende midler)
- Cabergolin og bromocriptin (midler, der hæmmer mælkeproduktionen)
- Atovaquon (middel mod malaria)

Når du tager Primperan, bør du begrænse dit indtag af alkohol, da alkohol kan forstærke den sløvende virkning af metoclopramid.

Anvendelse af Primperan sammen med mad og drikke

Hvis du anvender Primperan mod mavesymptomer, er det bedst at tage Primperan tabletter 20 minutter før et måltid. Tag tabletterne sammen med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Primperan efter lægens anvisning, og ikke i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan skade fosteret.

Amning

Du bør ikke tage Primperan, hvis du ammer, da metoclopramid bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Anvendelse af Primperan kan måske give bivirkninger (døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Denne virkning forstærkes af nervemedicin, stærke smertestillende midler og alkohol.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Primperan

Primperan tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du begynder at tage Primperan tabletter, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PRIMPERAN

Tag altid Primperan nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:
10-20 mg 3 gange daglig (svarende til 1-2 tabletter 3 gange daglig).

Børn 6-14 år:

5-10 mg 3 gange daglig (svarende til ½-1 tablet 3 gange daglig).

Børn 2-5 år:

0,5 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser.

Det er vigtigt, at du overholder tidsintervallet mellem doserne af Primperan, der skal gå mindst 6 timer mellem to doser hos børn under 15 år, også selv om barnet kaster medicinen op.

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion skal din dosis halveres, følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Primperan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Primperan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være stærk døsighed, ufrivillige bevægelser, kraftige muskelspændinger eller unormal hjerterytme. Hos børn kan der forekomme blåfarvning af læberne på grund af nedsat iltning af blodet (methæmoglobinæmi).

Hvis du har glemt at tage Primperan

Hvis du har glemt at tage en dosis Primperan, skal du fortsætte med næste dosis. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Primperan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen med Primperan efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Primperan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter)

- Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt, brystmerter – kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112
- Parkinson sygdom

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter)

- Forstyrrelser i blodet (specielt hos nyfødte)
- Kramper, høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed – søg straks læge
- Åndenød, angst, brystmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet – ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

11502973-02

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter)

- Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hududslæt, kløe og hævelser)
- Udeblevne menstruationer eller mælkeflåd
- Udvikling af brystkirtlen hos mænd
- Døsighed, kraftige muskelspændinger, ufrivillige bevægelser (se under "Det skal du vide, før du begynder at tage Primperan")
- Uro i benene (trang til at gå omkring)
- Diarré
- Kraftsløshed og svaghed

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Depression
- Langsomme, ufrivillige bevægelser (ved langtidsbehandling, specielt hos ældre)
- Mundtørhed
- Udslæt

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter)

- Langsom puls
- For højt blodtryk, for lavt blodtryk (specielt efter indsprøjtning af metoclopramid)
- Nældefeber

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive opdateret.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Primperan utilgængeligt for børn. Opbevar Primperan ved stuetemperatur (15 °C - 25° C).

Tag ikke Primperan tabletter efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

11502973-02

11502973-02