



50091657A

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Proctosedyl[®], rektalsalve

hydrocortison 5 mg/g, cinchocainhydrochlorid 5 mg/g,
framycetinsulfat 10 mg/g, aesculin 10 mg/g

sanofi aventis

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Proctosedyl til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Proctosedyl rektalsalve
3. Sådan skal du bruge Proctosedyl rektalsalve
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Proctosedyl rektalsalve modvirker kløe og irritation på grund af hæmorider ved endetarmsåbningen. Proctosedyl virker lokalbedøvende og dæmper betændelse. Proctosedyl rektalsalve får udvidede blodkar til at trække sig sammen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PROCTOSEDYL REKTALSALVE

Brug ikke Proctosedyl rektalsalve

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er overfølsom over for aminoglykosider, specielt neomycin (mod betændelse).
- hvis du har betændelse ved endetarmsåbningen.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Proctosedyl rektalsalve

- hvis du anvender Proctosedyl regelmæssigt gennem længere tid, kan indholdsstofferne blive optaget i kroppen. Smør kun rektalsalven på, omkring og i endetarmsåbningen. Hydrocortison kan beskadige huden og gøre den tynd.

Doping

Flere af indholdsstofferne står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer.

Brug af anden medicin

Du kan anvende Proctosedyl samtidig med andre lægemidler.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun anvende Proctosedyl efter lægens anvisning.

Amning

Du kan amme, selvom du anvender Proctosedyl, men tal først med din læge da et af indholdsstofferne i Proctosedyl (hydrocortison) bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Proctosedyl rektalsalve

Proctosedyl indeholder lanolin, som kan give lokalt hududslæt (fx kontaktesem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE PROCTOSEDYL REKTALSALVE

Brug altid Proctosedyl rektalsalve nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er:

Voksne: Påsmør Proctosedyl rektalsalve 2-3 gange daglig samt efter afføring.

Proctosedyl bør kun bruges i kortere perioder eller med pauser mellem behandlingerne for at mindske risikoen for bivirkninger. Proctosedyl bør ikke bruges i længere tid end 2 uger pr behandling.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Brugsanvisning

Vask hænderne. Påsmør rektalsalven i små mængder på smertefulde eller kløende områder med en finger. Du kan anvende rektalsalven i endetarmen ved at skrue rektalspidsen på tuben. Indfør rektalspidsen i fuld længde gennem endetarmsåbningen. Pres tubens nedre del let sammen, mens du trækker rektalspidsen ud. Rengør rektalspidsen og vask hænderne grundigt. Du kan anvende Proctosedyl rektalsalve alene eller sammen med Proctosedyl stikpiller.

Brug til børn

Du må kun anvende Proctosedyl til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Proctosedyl rektalsalve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har anvendt mere af Proctosedyl end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering: Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser, rystelser, forvirring, kramper, koma, nedsat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop.

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl rektalsalve

Har du glemt at anvende Proctosedyl, fortsætter du blot med at påsmøre næste dosis som ordineret.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Proctosedyl kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Tynd slimhinde i endetarmen, som giver en brændende fornemmelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter).

Eksem, tynd hud, allergiske reaktioner.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke Proctosedyl rektalsalve efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Proctosedyl rektalsalve indeholder:

Aktive stoffer:

Hydrocortison

Cinchocainhydrochlorid

Framycetinsulfat

Aesculin

Øvrige indholdsstoffer:

Lanolin

Hvid vaselin

Paraffinolie

Udseende og pakningsstørrelser

Proctosedyl rektalsalve er en gullig-hvid, gennemsigtig og fedtet salve, uden fremmede partikler.

Proctosedyl rektalsalve findes i tube indeholdende 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi-aventis Denmark A/S

Slotsmarken 13

2970 Hørsholm

Fremstiller:

Sanofi Synthelabo Ltd. Trading as Sanofi Aventis Ltd.

Edgefield Avenue, Fawdon

England

Denne indlægsseddel blev senest godkendt november 2010