

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Resonium, 999,34 mg/g, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension natriumpolystyrensulphonat.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Resonium til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Resonium
3. Sådan skal du bruge Resonium
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Resonium er en ionbytter. Under passagen gennem tarmen fjerner Resonium kalium og tilfører i stedet natrium.

Du kan bruge Resonium ved for meget kalium i blodet. For meget kalium kan give forstyrrelser af hjertefunktionen.

Lægen kan have givet dig Resonium for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE RESONIUM

Brug ikke Resonium hvis

- du er overfølsom (allergisk) over for natriumpolystyrensulphonat eller lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- du har for lavt indhold af kalium i blodet.
- du lider af en tarmsygdom, som giver tendens til stop i tarmpassagen, f.eks. operation, betændelser eller svulster (obstruktiv tarmsygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Resonium

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du får forstoppelse, skal du kontakte lægen.
- Du må ikke bruge afføringsmidler, der indeholder magnesium.
- Pas på, at du ikke kommer til at indånde Resonium pulveret.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Resonium. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin der indeholder sorbitol.
- Medicin mod forstoppelse (f.eks. magnesiumhydroxid, aluminiumkarbonat).
- Medicin mod sure opstød/halsbrand (syre-neutraliserende midler).
- Medicin for hjertet (digoxin).
- Medicin mod depression (lithium).
- Medicin mod for lavt stofskifte (levothyroxin).
- Vanddrivende medicin (loop-diuretika og thiaziddiuretika).
- Medicin mod kramper i mave og tarm (antikolinerge lægemidler).

Undgå desuden fødevarer, der indeholder sødemidlet sorbitol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, kan du bruge Resonium efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Resonium, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Resonium påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Resonium

Resonium indeholder 61,5 mmol (eller 1,5 g) natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE RESONIUM

Brug altid Resonium nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:**Voksne:**

1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange daglig.

Rør Resonium ud i lidt vand, lidt saft (men ikke juice, det indeholder kalium), lidt syltetøj eller honning inden du tager det. Undgå at indånde pulveret.

Børn:

Ved akut forhøjet kalium i blodet: 1 g/kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 30 g pulver daglig fordelt på flere doser.

Ved ligeholdelsesbehandling: 0,5 g/kg legemsvægt pr. dag, fordelt på flere daglige doser. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg, vil dosis normalt være 15 g pulver daglig fordelt på flere doser.

Rør Resonium ud i lidt vand, lidt saft (men ikke juice, det indeholder kalium), lidt syltetøj eller honning inden du giver det til barnet. Undgå at indånde pulveret.

Doseringsmål medfølger i dåsen. Et strøget doseringsmål er ca. 15 g.

Hvis du har opkastninger eller mavebesvær, kan du få Resonium til indhældning i endetarmen. Tal med lægen.

Hvis du har brugt for meget Resonium

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Resonium, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få:

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne, irritation, forvirring, langsom tankevirksomhed, nedsatte reflekser pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop).
- Kramper og uregelmæssig vejtrækning med vejtrækningspauser.

Hvis du har glemt at bruge Resonium

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Resonium

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Resonium kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul på tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Voldsomme periodiske smerter i maven, ingen afgang af luft eller afføring pga. stop for tarmpassagen. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (Det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. betændelse i lungerne efter indånding af Resonium. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Ved samtidig brug af sorbitol kan der forekomme vævs-død i tarmene.
- Betændelsestilstand i tyktarmen som følge af nedsat blodtilførsel.
- Blødning eller celle/vævs-død i tarmene som kan lede til hul på tarmen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Maveirritation, opkastning, appetitmangel/madlede, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
- Diarré.

Sjældne bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Hos for tidligt fødte børn og nyfødte med lav fødselsvægt, kan der komme rød blødning fra endetarmen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Nedsat niveau af magnesium i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Resonium ved almindelig temperatur.

Brug Resonium umiddelbart efter udrøring i væske. Resonium kan holde sig i 24 timer efter udrøring.

Brug ikke Resonium efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Resonium, 999,34 mg/g, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension, indeholder:

- Aktivt stof: Natriumpolystyrensulfonat.
- Øvrige indholdsstoffer: Vanillin, saccharin.

Udseende og pakningsstørrelser

Resonium sælges i dåser med 454 g pulver. Der er vedlagt et doseringsmål, som indeholder ca. 15 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie
196 rue du Maréchal Juin
45200 Amilly
France

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2010