

Livol Stærk B6 50 mg overtrukne tabletter

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge produktet. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningen i denne information. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge, apotek eller Dansk Drogenes medicinske rådgiver.

Livol Stærk B6 overtrukne tabletter, 50 mg indeholder:

Det aktive stof i Livol stærk B6 50mg er Pyridoxin som pyridoxinhydrochlorid 50 mg.
Hjælpemidler: Lactosemonohydrat, saccharose, majsstivelse, talcum, gelatine, povidon, flydende glucose (7mg), glycerol, macrogoler, kartoffelstivelse, magnesiumstearat, akaciegummi, kolloid vandfri silica, triglycerider af middelkædelængde, carnaubavoks, hvid bivoks.

Registreringsindehaver:

Dansk Droge
Industrigrenen 10, 2635 Ishøj
Tlf.: 43 56 56 56
E-mail: dd@danskdroge.dk
MT nr. 6221093

VIRKNING OG ANVENDELSE

Livol Stærk B6 50 mg er et stærkt B6- vitaminpræparat til forebyggelse og behandling af B6-vitaminmangel. B6 indgår i enzymsystemer med betydning for en lang række omsætningsprocesser i cellerne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Vigtig information, som skal læses, før du bruger Livol Stærk B6 50 mg.

Tilstande hvor Livol Stærk B6 50 mg ikke må anvendes: Livol stærk B6 50mg indeholder glucose. Når dosis-anbefalingen overholdes, kan hver dosis give op til 14 mg glucose.

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem at De ikke tåler visse sukkerarter. Bør ikke anvendes til patienter med glucose / galactosemalabsorption.

Særlige forholdsregler:

Bør anvendes med forsigtighed af patienter med nedsat nyrefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Livol Stærk B6 50 mg.

Graviditet og amning:

Kan anvendes. Bør som andre lægemidler ikke anvendes uden samråd med læge.

Få vejledning hos lægen, før du tager nogen form for medicin.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Sådan skal du tage Livol Stærk B6 50 mg

Dosering:

Voksne: 1 tablet 2 gange daglig. Tabletterne synkes med et glas vand. Kan evt. knuses.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Livol Stærk B6 50 mg kan tages sammen med mad og drikke.

Har du taget for mange Livol Stærk B6 50 mg?

Store doser (over 200-300 mg) kan skade de perifere nerver og give føleforstyrrelser samt lysfølsomhed.

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Livol Stærk B6 50 mg, end der står i denne information, eller mere end lægen har skrevet.

Mulige bivirkninger

Livol Stærk B6 50 mg kan i større doser give lysfølsomhed. Ret sjældent ses kvalme og mavesmerter.

Fortæl lægen hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Opbevaring

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved stuetemperatur.

Anvend ikke Livol Stærk B6 50 mg efter den udløbsdato der er anført på pakningen.

Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst rettet oktober 04.