

Livol Stærk jern.

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge produktet. Du kan få dette produkt uden recept.

For at få den bedste virkning skal du altid følge vejledningerne i denne information. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Livol stærk jern er en rund stærk hvælv, orangebrun, filmovertrukken tablet, der bruges til forebyggelse og behandling af jernmangel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION SOM SKAL LÆSES FØR DU TAGER LIVOL STÆRK JERN.**Brug ikke Livol stærk jern ved:**

Tilstande med forhøjet mængde røde blodlegemer (polycytæmi (erythrocytose)) og tilstande med forhøjede jerndepoter (hæmosiderose, hæmocromatose). Ved overfølsomhed overfor det aktive stof eller et eller flere hjælpestoffer.

Vigtig information om nogle af hjælpestofferne:

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Brug af Livol stærk jern sammen med mad og drikkevarer.

Du kan tage Livol stærk jern sammen med mad og drikke.

Særlige forholdsregler:

Afføringen farves sort af jerntilskud. Da afføringen også kan farves sort som følge af blødning i mavetarmkanalen, vanskeliggøres observation for en sådan blødning af samtlige jerntilskud. Falsk positiv reaktion på undersøgelse af afføring for blod ses ved visse metoder. Jerntilskud bør ikke fortsættes ud over 6 måneder uden lægelig vejledning.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Livol Stærk jern.

Graviditet og amning.

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin i forbindelse med graviditet eller amning.

Graviditet:

Livol stærk jern kan anvendes under graviditet

Amning:

Livol stærk jern kan anvendes i ammeperioden.

Brug af anden medicin:

Jernpræparater nedsætter optagelsen af tetracykliner, penicillamin, disulfiram (Antabus), samt af etidronat. Indtagelsen bør derfor ske med en tidsforskydning på mindst 3 timer. Kan nedsætte koncentrationen af quinoloner (f.eks. ciprofloxacin). Præparater, der indeholder aluminium, calcium

eller magnesium, nedsætter optagelsen af jerntilskud og bør derfor tages med et interval i forhold til jern på mindst 1½ time. Ascorbinsyre (vitamin C) øger optagelsen af jern. Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LIVOL STÆRK JERN:

Dosering

Forebyggende, voksne: 66 mg (1 tablet) daglig.

Behandling, voksne: 66 mg (1 tablet) op til 3 gange daglig.

Oral anvendelse.

Bør indtages med et glas vand i forbindelse med et hovedmåltid.

Tabletterne synkes hele.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

Har du taget for mange Livol stærk jern?

Akut overdosering kan give opkastning, diarré og mavesmerter. Forstyrrelser i syrebalance og sukkerstofskifte. Afkortet levetid for røde blodlegemer samt blødningstendens.

Bevidsthedssvækkelse og kramper. Lever- og nyreskader. Sent optrædende væskeudtrædning i lungerne. De alvorlige akutte forgiftningssymptomer kan ses ved doser over 30 mg pr. kg legemsvægt.

Akut forgiftning kræver umiddelbar hospitalsindlæggelse.

Kronisk overdosering: Ved langvarig overdosering kan opstå hemosiderose.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere af Livol stærk jern, end der står i denne information, eller mere end lægen har skrevet.

Har du glemt at tage Livol stærk jern?

Behandlingen genoptages i den anbefalede dosis. Du må ikke tage ekstra doser for at kompensere for de doser du har glemt.

4. MULIGE BIVIRKNINGER.

Afføringen farves sort. Livol stærk jern kan give forstoppelse, kvalme, opkastning og mavesmerter.

Bivirkningerne er dosisafhængige. Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. OPBEVARING:

Livol stærk jern skal opbevares utilgængeligt for børn.

Livol stærk jern skal opbevares ved stuetemperatur (15-25° C).

Anvend ikke Livol stærk jern efter den udløbsdato der er anført på pakningen.

Livol stærk jern indeholder:

Ferrofumarat svarende til 66 mg jern.

Tablethjælpestoffer: Majsstivelse, saccharose, talkum, povidon, macrogoler, hypromellose, kartoffelstivelse, kolloid vandfri silica, jernoxid (E172).

Markedsføres af:

Dansk Droge A/S

Industrigrenen 10

2635 Ishøj

MTnr.: 6201693

6. YDERLIGERE INFORMATION:

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst rettet august 2006