

Multi Vital Stærk C syreneutral tabletter.

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge produktet.

For at få den bedste virkning skal du altid følge vejledningerne i denne information. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller Dansk Drogenes medicinske rådgiver.

Muli Vital Stærk C syreneutral, tabletter indeholder:

Det aktive indholdsstof er: C-vitamin (som natriumascorbat og ascorbinsyre) 500mg.

Tablethjælpestoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Fremstillet for :

dansk supermarked i/s
Bjødstrupvej 18, Holme
DK-8270 Højbjerg

Registreringsindehaver:

Dansk Droge
Industrigrenen 10, 2635 Ishøj
Tlf.: 43 56 56 56
E-mail: dd@danskdroge.dk
MTnr.: 6231799

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Multi Vital Stærk C syreneutral er et stærkt C-vitaminpræparat som anvendes til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

C- vitamin er en antioxidant med betydning for cellens iltomsætning. C-vitamin behovet er øget ved større læsioner, forbrændinger og ved alvorlige betændelsestilstande. Behovet for C-vitamin er let øget hos rygere.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. VIGTIG INFORMATION, SOM SKAL LÆSES, FØR DU BRUGER MULTI VITAL STÆRK C SYRENEUTRAL:**Brug ikke Multi Vital stærk C syreneutral hvis:**

Du har tendens til nyresten, nedsat nyrefunktion eller glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel.

Da Multi Vital Stærk C syreneutral øger jernoptagelsen, bør Multi Vital Stærk C syreneutral derfor heller ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme.

Særlige forholdsregler:

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Multi Vital Stærk C syreneutral.

Graviditet og amning.

Kan anvendes.

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Brug af anden medicin:

Ved indtagelse af jernbindende midler (deferoxamin) forøges effekten af dette, hvorfor indtagelse af C-vitamin bør undgås de 2 første uger af deferoxaminbehandling.

Store doser C-vitamin kan påvirke behandlingen med blodfortyndende medicin.

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MULTI VITAL STÆRK C SYRENEUTRAL:**Dosering**

Voksne: 1-2 tabletter daglig. Tabletterne bør indtages med et glas vand i forbindelse med et hovedmåltid. Tabletten kan evt. deles, tygges eller knuses.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har du taget for mange Multi Vital Stærk C syreneutral?

Ved indtagelse af store doser C-vitamin (over 1 g), kan ses blæreirritation og diarré. Store doser C-vitamin kan hos visse personer medføre risiko for forhøjet oxalindhold i urinen med risiko for stendannelse.

Ved overdosering kan muligvis ses en mangeltilstand efter pludselig ophør med tilskuddet ("rebound fænomen"). Dette gælder også spædbørn, hvis mødre under graviditet har indtaget store doser C-vitamin.

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Multi Vital Stærk C syreneutral, end der står i denne information, eller mere end lægen har skrevet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER.

Ingen kendte. Multi Vital Stærk C syreneutral kan som al anden medicin give bivirkninger.

Fortæl lægen hvis du får bivirkninger, således at bivirkningerne kan blive indberettet til

Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl lægen, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

5. OPBEVARING:

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved stuetemperatur.

Anvend ikke Multi Vital Stærk C syreneutral efter den udløbsdato der er anført på pakningen.

6. YDERLIGERE INFORMATION:

Aflever medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst rettet november 2004