

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dexofan® 30 mg filmovertrukne tabletter

Dextromethorphanhydrobromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Dexofan® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dexofan®
3. Sådan skal du tage Dexofan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dexofan® er et hostestillende lægemiddel, som hæmmer hosterefleksen. Du kan bruge Dexofan® ved tør hoste uden slim.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DEXOFAN®

Tag ikke Dexofan®:

- hvis du er overfølsom overfor dextromethorphanhydrobromid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- ved samtidig behandling eller hvis du for nylig har været i behandling med en MAO-hæmmer (mod depression eller Parkinsons sygdom). Tal med lægen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dexofan®

Hvis du har særlig kraftig slimproduktion i luftvejene eller hoste med slim, skal du stoppe med at tage Dexofan®, da medicinen hæmmer din hosterefleks, og du derfor ikke får hostet slimen løs.

Dexofan®'s søvndyssende og åndedrætshæmmende virkning forstærkes, hvis du samtidig tager anden medicin, der virker hæmmende på åndedrættet eller er søvndyssende.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- depression eller Parkinsons sygdom (MAO hæmmere)

- hjerteproblemer (kinidin)
- uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)
- depression (SSRI)
- skizofreni og/eller psykoser (haloperidol)

Brug af Dexofan® sammen med mad og drikke

Du kan tage Dexofan® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Dexofan® efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Dexofan® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dexofan® kan give bivirkninger (døsighed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dexofan®

Dexofan® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DEXOFAN®

Tag altid Dexofan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletten tages hel sammen med rigelig væske. Tabletten kan evt. deles eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 11 år: ½ – 1 tablet (15 – 30 mg) 3 – 4 gange daglig.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning

Børn: Børn under 11 år må kun få Dexofan® efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dexofan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Dexofan®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er døsighed, ufrivillige øjenbevægelser, manglende koordineringsevne, vejtrækningsbesvær, kvalme og opkastninger, hyperaktivitet, opstemthed, sløret tale, forvirring og hallucinationer og i svære tilfælde bevidstløshed eller koma.

Hvis du har glemt at tage Dexofan®

Hvis du har glemt en dosis Dexofan®, så tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Dexofan®

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dexofan® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Hallucinationer,

Ikke alvorlige: Opstemthed, svimmelhed, døsighed, ufrivillige bevægelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Misbrug er set

Ikke alvorlige: Hududslæt, afgrænset medikamentelt udslæt (fixed drug eruption).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning, er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Dexofan® utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Dexofan® ved almindelig temperatur.

Brug ikke Dexofan® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dexofan® 30 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: dextromethorphanhydrobromid.

Øvrige indholdsstoffer: gelatine, hypromellose (E 464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470 b), majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553 b), og vandfri kolloid silica (E 551). Farve: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Dexofan[®] er en hvid, rund, hvælvet, filmovertrukken tablet med delekærv.

Dexofan[®] findes i pakningsstørrelser à 20 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2011