

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Novaluzid, tyggetabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Novaluzid uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Novaluzid.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Novaluzid
3. Sådan skal du tage Novaluzid
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan anvende Novaluzid ved sure opstød, svien og brænden i maven på grund af for megen mavesyre og ved let grad af spiserørskatar.

Novaluzid virker på smerter ved mavesår og sår på tolvfingertarmen, men ved disse lidelser bør du tale med lægen.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Novaluzid for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NOVALUZID

Tag ikke Novaluzid

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Novaluzid

Du bør kun bruge Novaluzid mod mavesår efter aftale med lægen.

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du tager Novaluzid igennem længere tid, kan det medføre ændringer i kroppens calcium/fosfat balance (kalkbalancen). Kontakt din læge, hvis du bruger Novaluzid i længere tid.

Hvis du tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), skal du være forsigtig med at anvende Novaluzid. Novaluzid kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke tage Novaluzid sammen med enterotabletter, da Novaluzid kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apotekspersonalet.

Du må ikke tage Novaluzid sammen med følgende lægemidler:

- Antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, cefpodoxim, tetracyklin).
- Middel (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata).
- Svampemiddel (ketoconazol).

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Novaluzid og følgende lægemidler:

- D-vitamin (calcitriol).
- Middel mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat).
- Smertestillende middel (diflunisal).
- Hjertermedicin (digoxin, sotalol).
- Antabus (disulfiram).
- Blodtryksnedsættende middel (fosinopril).
- Middel mod epilepsi eller smertestillende middel (gabapentin).
- Middel mod tuberkolose (isoniazid).
- Jern.
- Antibiotika (levofloxacin, cefdinir, gatifloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin, moxifloxacin).
- Middel, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil).
- Middel mod gigt (penicillamin).
- Middel mod mavesår (ranitidin).
- Middel for stofskiftet (thyreoideahormoner).
- Middel mod kolesterol i blodet (atorvastatin, rosuvastatin).

Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Novaluzid og trovafloxacin (antibiotikum).

Brug af Novaluzid sammen med mad og drikke

Frugtjuice og andre citratholdige drikke kan øge optagelsen af aluminium. Novaluzid kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Novaluzid under graviditet.

Amning

Du kan amme, selvom du tager Novaluzid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Novaluzid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Novaluzid

Novaluzid tyggetabletter indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NOVALUZID

Dosering

Indikation: Sure opstød, svien i maven og spiserørskatar.

Voksne: 1-2 tyggetabletter ved smerter.

Indikation: Mavesår og sår på tolvfingertarmen.

Voksne: 3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid.

Nedsat nyrefunktion: Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Novaluzid. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Børn: Du må kun bruge Novaluzid til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Brugsanvisning

Tyggetabletterne skal tygges grundigt. Det er ikke nødvendigt at drikke vand bagefter.

Hvis du har taget for mange Novaluzid tyggetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Novaluzid, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Ved brug af store doser Novaluzid kan patienter med nedsat nyrefunktion få symptomer, der ligner curareforgiftning (muskellammelse).

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Novaluzid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Hos patienter med nedsat nyrefunktion, kan der forekomme øget mængde af magnesium i blodet (ses ved f.eks. sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt).

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der komme demens, kræmper, forvirring og bevidstløshed. I tilfælde af alvorlige bivirkninger, ring 112 eller søg omgående læge.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Forstoppelse eller diaré.

Sjældne bivirkninger (sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Svær og alvorlig tilstoppelse af tarmen ved brug af meget høje doser. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der forekomme ændring i personlighed og pludselige ufrivillige muskellammelser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Novaluzid efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Novaluzid tyggetabletter indeholder:

- Aktivt stoffer: aluminiumoxid 265 mg og magnesiumoxid 195 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Pebermynteessens, lemonessens, hypromellose, magnesiumstearat, sorbitol (E420) 750 mg og talcum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Novaluzid er en hvid, rund tyggetablet. Den er mærket A/nT og har delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning: 30, 60 og 100 tyggetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

MEDA

Solvang 8

3450 Allerød

Fremstiller

Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

og

Orion Corporation, Orion Pharma, Turku
Tengströminkatu 8
20360 Turku
Finland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2010