

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sesal

5 mg/ml + 0,25 mg/ml øjendråber, opløsning

Antazolinhydrochlorid/naphazolinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Sesal uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Sesal.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3-4 dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sesal
3. Sådan skal du bruge Sesal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sesal øjendråber indeholder et antihistamin (antazolin), som lindrer symptomerne ved overfølsomhed og naphazolin, som trækker de små blodårer sammen.

Du skal bruge Sesal mod røde og kløende øjne pga. allergi.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Sesal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sesal

Brug ikke Sesal, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for antazolinhydrochlorid og naphazolinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har grøn stær (glaukom med snæver kammervinkel)
- er i behandling med medicin mod depression (MAO-hæmmere)

Du må ikke bruge Sesal til børn under 5 år.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sesal

Tal med lægen inden du bruger Sesal, hvis du

- har tørre øjne
- har forhøjet blodtryk
- har forstyrrelser i hjerterytmen
- er ældre og har alvorlige hjerte-karsygdomme.
- har diabetes (sukkersyge)
- har for højt stofskifte

- har svulst i binyren (fæokromocytom)

Du skal kontakte lægen, hvis

- dine symptomer fortsætter i mere end 3-4 dage.
- dine symptomer bliver værre.
- du får smerter i øjnene og sløret syn efter drypning.

Vær opmærksom på følgende

- Hvis du har betændelse i næseslimhinden (rhinitis sicca), er det vigtigt at lukke øjnene i ca. 1 minut, efter du har dryppet øjnene, for at forhindre øjendråberne i at løbe ned i næsen.
- Hvis du bruger Sesal for længe eller i for store doser, kan du få forværring af symptomerne med meget røde øjne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du må ikke bruge Sesal, hvis du tager medicin mod depression af typen MAO-hæmmere. Tal med lægen.

Tal med lægen, hvis du tager

- medicin mod sindslidelser (antipsykotika).
- medicin mod depresion (af typen tricycliske antidepressiva).
- beroligende medicin eller sovemedicin.

Vær opmærksom på

- Hvis du drikker alkohol, når du bruger Sesal, kan den sløvende virkning forstærkes.
- Hvis du udover Sesal bruger andre øjendråber, skal du vente mindst 5 minutter mellem drypningerne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Sesal. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Sesal efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sesal kan give bivirkninger som døsighed, svimmelhed og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Sesal

Sesal er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene, samt misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. Sådan skal du bruge Sesal

Hvis din læge har ordineret Sesal til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 dråbe 3–4 gange daglig i op til 14 dage.

Børn: Du må ikke bruge Sesal til børn under 5 år.

Du må kun bruge Sesal til børn mellem 5 og 15 år efter aftale med en læge.

Hvis behandlingen med Sesal ikke hjælper i løbet af 3-4 dage, skal du kontakte din læge.

Brugervejledning

- Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget hårdt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.
- Pres let på flaskens bund med pegefingeren, når øjet skal dryppes.
- Træk ned i nederste øjenlåg, og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.
- Undgå at beholderens spids rører hud eller øjne.
- I 2 minutter efter drypning skal du klemme tårekanalen sammen ved at presse med en finger i øjenkrogen.



Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.

Hvis du har brugt for meget Sesal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere øjendråber, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Sesal

Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at dryppe øjnene. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Sesal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Alvorlige bivirkninger**Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt**

- Hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

- Brændende/stikkende fornemmelse ved drypning og lokale allergiske reaktioner, som øget kløe og rødme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

- Hovedpine, søvnighed, svimmelhed, døsighed, rysten.
- Svedtendens.
- Tiltagende rødme i øjet.
- Sløret syn, udvidelse af pupillen.
- Tørre øjne.
- Kronisk øjenbetændelse med røde øjne, brændende fornemmelse og tåreflåd, evt. med hævede øjenlåg.
- Øget sekret i øjet.
- Ændring af farven i øjets regnbuehinde.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Sesal utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Sesal ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Sesal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 1 måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Sesal 5 mg/ml + 0,25 mg/ml, øjendråber indeholder:

- Aktive stoffer: Naphazolinhydrochlorid og antazolinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, borsyre, borax og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Sesal er en klar farveløs væske.

Pakningsstørrelse

10 ml plastflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Ophtha A/S - en del af Actavis Gruppen, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Denne indlægsseddel blev sidst revideret Oktober 2013