

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sulfametizol Actavis

Øjendråber, opløsning 4 %

Sulfamethizol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Sulfametizol Actavis til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sulfametizol Actavis
3. Sådan skal du bruge Sulfametizol Actavis
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Sulfametizol Actavis virker ved at hæmme væksten af bakterier.
Du skal bruge Sulfametizol Actavis til behandling af betændelse i øjet.

Lægen kan give dig Sulfametizol Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Sulfametizol Actavis

Brug ikke Sulfametizol Actavis, hvis du

- er overfølsom (allergisk) over for sulfamethizol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Sulfametizol Actavis

Vær opmærksom på følgende

- Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du er i behandling for betændelse i øjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter, inden du drypper med et andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Sulfametizol Actavis under graviditet.

Amning

Du kan bruge Sulfametizol Actavis, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sulfametizol Actavis kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Sulfametizol Actavis

Brug altid Sulfametizol Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Dryp øjet 5-6 gange daglig.

Brugervejledning

Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget hårdt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.

Denne flasketype er lettest at bruge, hvis du presser let på flaskens bund med pegefingeren, når du skal dryppe øjet.

Træk ned i nederste øjenlåg og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget. Undgå at beholderen spids rører hud eller øjne.



Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.

Hvis du har brugt for meget Sulfametizol Actavis øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Sulfametizol Actavis øjendråber, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Hvis du har glemt at bruge Sulfametizol Actavis

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Sulfametizol Actavis

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Sulfametizol Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppigheden er ikke kendt

- Rødme og svie i øjet pga. kontaktallergi.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Sulfametizol Actavis utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Sulfametizol Actavis ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Sulfametizol Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Du må kun bruge Sulfametizol Actavis 1 måned efter åbning.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Sulfametizol Actavis 40 mg/ml øjendråber indeholder

Aktivt stof: sulfamethizol (som sulfamethizolnatrium).
Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat, sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse**Udseende**

Sulfametizol Actavis er en klar, farveløs til let gullig væske.

Pakningsstørrelse

5 ml plastflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2013