

Virigen® tabletter 5 mg

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

- Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information.
- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her.
- Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver værre, bliver ved og er generende.

I denne information er der oplysninger om:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Virigen®
3. Sådan skal du tage Virigen®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Virigen® påvirker den glatte muskulatur i blodkarrene i penis, så blodkarrene udvides. Herved lettes blodgennemstrømningen i penis, så rejsning (erektion) eventuelt opnås. En eventuel virkning indtræder først efter 2-3 ugers behandling. Virkningen af en enkeltdosis er 2-3 timer.

Virigen® anvendes til behandling af impotens.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du tager Virigen®

Tag ikke Virigen®, hvis:

- du er overfølsom over for det virksomme indholdsstof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Virigen®
- du har forhøjet blodtryk.

L1714-31

Særlige forholdsregler

Tal med lægen, hvis:

- du lider af en hjertekarsygdom
- du lider af hurtig hjerterytme
- du har forhøjet blodtryk
- du har nedsat nyrefunktion
- du har nedsat leverfunktion
- du lider af angst eller depression
- du har grøn stær
- du har mavesår.

Du bør være forsigtig med samtidig indtagelse af alkohol, da Virigen® kan forstærke virkningen af alkohol.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

- visse lægemidler mod depression
- visse lægemidler mod stærke smerter
- visse lægemidler mod forhøjet blodtryk
- alprazolam (lægemiddel mod angst).

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Brug af Virigen® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Virigen® sammen med mad og drikke (se dog afsnittet "Særlige forholdsregler").

Graviditet og amning

Virigen® bruges ikke til kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virigen® kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Virigen®

Virigen® indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.



Virigen Tabletter 5mg DK

t 0044 1271 311400
f 0044 1271 311449
@ artworkstudio@actavis.
isdn co.uk

approved for print/date

item no: L1714-31

print proof no: 2

origination date: 19.12.07

originated by: dje

revision date: 18.01.08

revised by: dje

dimensions: 140x200

pharmacode:

design repeat (single):

web:

colours/plates:

Black

pms 547



3. Sådan skal du tage Virigen®

Dosering

Mænd over 18 år:

1-2 tabletter (5-10 mg) 1-3 gange daglig.
Virkningen indtræder først efter 2-3 ugers behandling.
Virkningen af en enkelt dosis er 2-3 timer. Du kan tage Virigen® i op til 8 uger.

Du skal tage Virigen® med et stort glas vand.

Har du taget for mange Virigen®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Virigen®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for meget Virigen®, kan du opleve følgende symptomer: Forbigående forhøjet blodtryk og hurtig hjerterytme, ophidselse, koma (dyb bevidstløshed) og epilepsilignende kramper, delvis lammelse af urinblæren.

Har du glemt at tage Virigen®?

Hvis du har glemt at tage Virigen®, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Virigen® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Der er ingen alvorlige bivirkninger ved brug af Virigen®.

Ikke alvorlige bivirkninger:

De oftest forekommende bivirkninger er forhøjet blodtryk, svimmelhed og indre uro.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed, nervøsitet, indre uro, forhøjet blodtryk, hurtig hjerterytme og hjertebanken.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
L1714-31

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Virigen® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Virigen® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Virigen® tabletter 5 mg indeholder:

Det virksomme indholdsstof er yohimbin.
De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat, kartoffelstivelse, gelatine, talcum og magnesiumstearat.

Udseende:



Virigen® er hvide tabletter med delekærv.

Markedsføring i Danmark og fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Revideret februar 2007



		Virigen Tabletter 5mg DK	
t	0044 1271 311400	item no:	L1714-31
f	0044 1271 311449	print proof no:	2
@	artworkstudio@actavis.	origination date:	19.12.07
isdn	co.uk	originated by:	dje
approved for print/date		revision date:	18.01.08
		revised by:	dje
		dimensions:	140x200
		pharmacode:	
		design repeat (single):	
		web:	
		colours/plates:	
		Black	
		pms 547	