

Livol store C.

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge produktet. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningen i denne information. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt lægen.

Livol store C indeholder:

Det aktive stof i Livol store C er: C-vitamin (som natriumascorbat og ascorbinsyre) 400mg.
Hjælpesoffer: Saccharose (834 mg), kartoffelstivelse, povidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, E163 drueskalsfarve, α -tocopherolacetat, acesulfamkalium, solbærearoma, sorbitol (85 mg).

Registreringsindehaver:

Dansk Droge A/S
Industrigrenen 10, 2635 Ishøj
Tlf.: 43 565656
MTnr.: 62011963

VIRKNING OG ANVENDELSE:

Til forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel. Livol store C er en antioxidant med betydning for cellernes iltomsætning. Behovet for vitamin C er øget ved større skader, forbrændinger og ved alvorlige betændelsestilstande. Behovet for vitamin C er let øget hos rygere. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

VIGTIG INFORMATION, SOM SKAL LÆSES, FØR DU BRUGER Livol store C.**Brug ikke Livol store C hvis:**

C-vitamin øger jernoptagelsen og tilskud bør derfor ikke anvendes af personer med jernophobningssygdomme. Bør ikke anvendes af personer med tendens til nyresten, med nedsat nyrefunktion eller glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel.

Særlige forholdsregler:

Kan ved tygning gennem længere tid i større doser, give skader på tandemaljen.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Livol store C.

Graviditet og amning:

Kan anvendes. Som for andre lægemidler bør præparatet ikke anvendes under graviditet og amning uden lægens anvisning.
Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Brug af anden medicin:

Ved samtidig indtagelse af jernbindende lægemidler (deferoxamin) forøges effekten af medicinen. Dette kan medføre hjertekomplikationer, hvorfor ascorbinsyreindtagelse bør undgås de første 2 uger af deferoxaminbehandling. Store doser C-vitamin kan påvirke behandlingen med blodfortyndende medicin.

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

SÅDAN SKAL DU TAGE/BRUGE Livol store C.

Dosering

Voksne: 1-2 tabletter daglig. Tabletterne tygges eller synkes.

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Har du taget for mange Livol Store C?

Ved indtagelse af store doser (over 1 g), kan ses blæreirritation og diarré. Store doser C-vitamin kan hos visse personer medføre risiko for forhøjet oxalindhold i urinen med risiko for stendannelse.

Ved overdosering kan muligvis ses en mangeltilstand efter pludselig ophør med tilskuddet ("rebound fænomen"). Dette gælder også spædbørn, hvis mødre under graviditeten har indtaget store doser vitamin C.

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Livol store C, end der står i denne information, eller mere end lægen har skrevet.

MULIGE BIVIRKNINGER.

Ingen kendte. Livol store C kan som al anden medicin give bivirkninger.

Fortæl læge hvis du får andre bivirkninger end dem der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

OPBEVARING:

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved stuetemperatur.

Anvend ikke Livol store C efter den udløbsdato der er anført på pakningen.

YDERLIGERE INFORMATION.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Denne information er sidst rettet juli. 2005