



Prosolvin Vet.

INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING

■ NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
Virbac - 1ere avenue 2065 M - LID - 06516 Carros - Frankrig

Repræsentant
Virbac Danmark A/S - Profilvej 1 - 6000 Kolding

■ VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN : Prosolvin Vet.

■ ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(ER) OG ANDRE INDHOLDSTOFFER
1 ml indeholder:Luprostiol7,5 mg.
Natriumhydroxid. Renset vand. Propylenglycol.

■ INDIKATIONER
Kvæg: Brunstinduktion og -synkronisering.
Kronisk metritis.
Hest: Brunstinduktion.
Svin: Forebyggelse og afbrydelse af forlænget drægtighed.

■ KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes intravenøst.
Må ikke anvendes til drægtige dyr med mindre abort ønskes.

■ BIVIRKNINGER
Bivirkninger kan primært henføres til effekten på den glatte muskulatur.Svedudbrud og nedsat rectaltemperatur (ofte hos hoppe), herudover forøget hjerte- og respirationsfrekvens, kolik og inkoordination. Symptomerne ses inden for 15 min. og forsvinder efter 1 time.Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.
Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

■ DYREARTER
Hest. Kvæg. Svin.

■ DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESEJE(E)
Kvæg:15 mg (2 ml) i.m.
Hest: 7,5 mg (1 ml) i.m.
Svin: 7,5 mg (1 ml) i.m.
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

■ SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER
Særlige advarsler for hver dyreart
Svin: Induktion af faring på et for tidligt tidspunkt i drægtigheden kan forårsage fødsel af ikke-levedygtige grise.
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Induktion af abort eller fødsel kan forårsage kompliceret fødsel, føtal død, tilbageholdt efterbyrd og metritis.
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Prostaglandiner kan absorberes gennem huden. På grund af PGF's bronchiekonstriktoriske virkning, bør personer med astma, bronchiale eller respiratoriske problemer, udvise stor forsigtighed ved håndtering. Da PGF tillige fremkalder abort hos mennesker, bør det ikke anvendes af gravide. Ved spild på huden skal afvaskning foretages.

■ TILBAGEHOLDESESTID
Slagtning:3 døgn.
Lokal kassation af injektionsstedet ved slagtning inden 30 døgn efter behandling.
Mælk:1 døgn.

■ EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING
Opbevaringstid efter anbrud 3 år.Opbevares utilgængeligt for børn.

■ EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF
UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT
Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

■ DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF INDLÆGSSEDLEN
1.2.2009

Virbac SANTÉ ANIMALE Service Création Responsable : Dossier pris en charge par : Nom du produit : PROSOLVIN	Pays : FRANCE Code produit fini : 200191 Élément : NOTICE RECTO Code famille : 30E Code élément : 83352902 Logiciel utilisé : ILLUSTRATOR CS2 Format : 105 x 330 Grammage : 65 G PLJEE 105 x 27 Observations : CP 16/12/10 POA	COULEURS RECTO Bleu Reflex Blue Rouge 485